


# — OMEDIT ALSACE

— Liste Préférentielle de Médicaments adaptés à la  
Personne Agée en EHPAD



OMEDIT ALSACE



■ Voies digestives et métabolisme	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
-----------------------------------	--	-----------	-----	---------	-------------------	----------------------------	---------------------------------	----	----

## Préparations stomatologiques

### Anti-infectieux pour traitement oral local


<b>Chlorhexidine + chlorobutanol</b>	ELUDRIL®	oui	modéré	0,5 ml/100 ml 0,5 g/100 ml	Sol. pour bain de bouche (fl. 90 ml)	A utiliser en bain de bouche après dilution dans de l'eau.	Tenir compte de la présence d'éthanol. <i>Conservation : 2 semaines à t° ambiante après première ouverture.</i>		
--------------------------------------	----------	-----	--------	-------------------------------	---	--	--	--	--

## Médicaments pour les troubles de l'acidité

### Antiacides

<b>Bicarbonate de sodium + alginate</b>	GAVISCON®	oui	faible	250 mg/5 ml	Susp. buvable (sach. 10 ml, fl. 250 ml)	A administrer à distance des autres médicaments (minimum 2h).	Tenir compte de la teneur en sodium. <i>Conservation : 3 mois après ouverture.</i>		
---	-----------	-----	--------	-------------	--	---	---	--	--

■ Voies digestives et métabolisme	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
<p><b>Bicarbonate de sodium + alginate</b></p>	<p>GAVISCON® Menthe</p>	<p>non</p>	<p>faible</p>	<p>500 mg</p>	<p>Cp. à croquer</p>	<p>A croquer avant d'avaler. A administrer après les repas.</p>	<p>Tenir compte de la teneur en sodium.</p>		
<p>Médicaments pour l'ulcère gastro-duodéal et le reflux gastro-oesophagien</p>									
<p>Inhibiteurs de la pompe à protons</p>									
<p><b>Esoméprazole</b></p>	<p>INEXIUM®</p>	<p>oui</p>	<p>important</p>	<p>20 mg 40 mg</p>	<p>Cp. gastro-résistant</p>	<p>A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer les microgranules.</p>			<p>⚠</p>
<p><b>Lanzoprazole</b></p>	<p>LANZOR® OGAST®</p>	<p>oui</p>	<p>important</p>	<p>15 mg 30 mg</p>	<p>Gélule gastro-résistante</p>	<p>A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. Possibilité d'ouvrir la gélule et diluer dans un liquide ou un aliment. A administrer au moins 30 minutes avant les repas.</p>			<p>⚠</p>
<p><b>Lanzoprazole</b></p>	<p>OGASTORO®</p>	<p>non</p>	<p>important</p>	<p>15 mg 30 mg</p>	<p>Cp. orodispersible</p>	<p>A avaler avec de l'eau. Possibilité de laisser fondre sur la langue ou de disperser dans de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer les microgranules. A administrer 30 minutes avant les repas.</p>			<p>⚠</p>

 Voies digestives et métabolisme	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Oméprazole	MOPRAL®	oui	important	10 mg 20 mg 40 mg	Gélule gastro-résistante	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer les microgranules. Possibilité d'ouvrir la gélule et de mélanger le contenu avec un aliment acide.			/Δ
Oméprazole	ZOLTUM®	oui	important	10 mg 20 mg	Gélule gastro-résistante	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer les microgranules. Possibilité d'ouvrir la gélule et de mélanger avec un aliment acide.			/Δ
Pantoprazole	EUPANTOL® INIPOMP®	oui	important	20 mg 40 mg	Cp. gastro-résistant	A administrer à jeun avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer.			/Δ

Voies digestives et métabolisme	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
---------------------------------	--	-----------	-----	---------	-------------------	----------------------------	---------------------------------	----	----

### Autres médicaments pour les troubles de l'acidité

<b>Diosmectite</b>	SMECTA®	non	modéré / faible	3 g	Susp. buvable (poudre en sach.)	A avaler juste après dilution dans un verre d'eau. A administrer à distance de tout autre médicament : - après les repas dans les oesophagites. - à distance des repas dans les autres indications.			
--------------------	---------	-----	-----------------	-----	---------------------------------	--	--	--	--

### Médicaments pour les désordres fonctionnels gastro-intestinaux

#### Autres médicaments pour les troubles de l'acidité

<b>Phloroglucinol</b>	SPASFON®	non	faible	80 mg	Cp. enrobé	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer.			
<b>Phloroglucinol</b>	SPASFON LYOC®	oui	faible	80 mg 160 mg	Lyophilisat oral	A laisser fondre sous la langue ou avaler après dissolution dans un verre d'eau.			
<b>Phloroglucinol</b>	SPASFON®	oui	faible	150 mg	Suppositoire	A administrer par voie rectale.			

Voies digestives et métabolisme	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Stimulants de la motricité intestinale									
Dompéridone	MOTILIUM® PERIDYS®	oui	modéré / insuffisant	10 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer avant les repas.	Si impossibilité d'avaler, préférer MOTILIUM® suspension buvable ou lyophilisat oral.	/!	/!
Dompéridone	MOTILIUM®	oui	modéré / insuffisant	1 mg/ml	Susp. buvable (fl. 200 ml)	A prendre par voie orale. A administrer avant les repas.	Conservation : 3 mois après ouverture.	/!	/!
Dompéridone	Génériques	oui	modéré / insuffisant	10 mg	Cp. orodispersible	A avaler avec de l'eau. Possibilité de laisser fondre sur la langue. Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer avant les repas.		/!	/!

Voies digestives et métabolisme	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
---------------------------------	--	-----------	-----	---------	-------------------	----------------------------	---------------------------------	----	----

## Antiémétiques et antinauséux

Scopolamine <sup>L</sup>	SCOPODERM TTS®	non	non remboursé	1 mg/72 h	Dispositif transdermique	A appliquer sur la peau sèche, saine et dépourvue de poils. Nettoyer le lieu d'application après chaque pose. Se laver les mains après chaque pose.	Place de la scopolamine dans cette rubrique au regard de la classification ATC. Cependant, l'indication considérée est le traitement en soins palliatifs des râles agoniques liés à l'encombrement des voies aériennes supérieures par excès de sécrétions salivaires. <b>Inapproprié selon la liste de Laroche dans l'indication digestive.</b>	/!	/!
--------------------------	-------------------	-----	------------------	-----------	-----------------------------	--	--	----	----

## Laxatifs

### Laxatifs lubrifiants

Huile de paraffine <sup>B P</sup>	LANSOYL® (framboise)	non	non remboursé	78,23 g/100 g	Gel oral (unidose et pot 225 g)	A administrer en dehors d'un repas. Ne pas s'aliter dans les deux heures suivant la prise.	Ne pas utiliser de façon prolongée : réduit l'absorption des vitamines liposolubles (A, D, E, K). Tenir compte de la teneur en sucre. Tenir compte du délai d'action (6 à 8h). <b>Inapproprié selon la liste de Beers et Priscus : risque d'inhalation. Autre alternative disponible : laxatifs osmotiques.</b>		
---	-------------------------	-----	------------------	---------------	------------------------------------	---	---	--	--



Voies digestives et métabolisme	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Huile de paraffine <sup>BP</sup>	LANSOYL® (sans sucre)	non	non remboursé	78,23 g/100 g	Gel oral (pot 215 g)	A administrer en dehors d'un repas. Ne pas s'aliter dans les deux heures suivant la prise.	Ne pas utiliser de façon prolongée: réduit l'absorption des vitamines liposolubles (A, D, E, K). Tenir compte du délai d'action (6 à 8h). <b>Inapproprié selon la liste de Beers et Priscus : risque d'inhalation. Autre alternative disponible : laxatifs osmotiques.</b>		
Laxatifs de lest									
Gomme sterculia	NORMACOL®	non	faible	62 g/100 g	Granulé enrobé (sach.)	A avaler avec un grand verre d'eau. Ne pas croquer. A administrer après un repas. Ne pas s'allonger après la prise.	Tenir compte de la teneur en sucre. S'assurer que la ration hydrique est suffisante.		
Psyllium	TRANSILANE®	non	faible	2,816 g	Susp. buvable (poudre en sach.)	A agiter et à boire immédiatement après dilution dans un verre d'eau. A administrer avant un repas.	Tenir compte de la teneur en potassium et en sucre.		

■ Voies digestives et métabolisme	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
	Psyllium TRANSILANE® (sans sucre)	non	faible	3 g	Susp. buvable (poudre en sach.)	A agiter et à boire immédiatement après dilution dans un verre d'eau. A administrer avant un repas.	Tenir compte de la teneur en sucre (fructose).		
Laxatifs osmotiques									
	Lactulose DUPHALAC®	oui	modéré	10 g/15 ml	Sol. buvable (sach. 15 ml, fl. 100 ml)	Voie orale : à avaler pur ou dilué dans une boisson.	<i>Conservation : 2 semaines après ouverture. Ne pas mettre au réfrigérateur (risque de cristallisation).</i>		
	Macrogol (4000) FORLAX®	oui	modéré	10 g	Sol. buvable (poudre en sach.)	A avaler juste après dilution dans un verre d'eau.			
	Macrogol (3350) + bicarbonate de sodium + chlorure de potassium + chlorure de sodium TRANSIPEG®	non	modéré	2,95 g 5,9 g	Sol. buvable (poudre en sach.)	A avaler juste après dilution dans de l'eau.	Tenir compte de la teneur en sodium et en potassium.		

Voies digestives et métabolisme	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
<b>Macrogol (3350)</b> + bicarbonate de sodium + chlorure de potassium + chlorure de sodium	MOVICOL® (chocolat, citron, sans arôme)	non	modéré	13,125 g	Sol. buvable (poudre en sach.)	A avaler juste après dilution dans de l'eau.	Tenir compte de la teneur en sodium et en potassium.		
<b>Lavements</b>									
<b>Phosphate monosodique et disodique</b>	NORMACOL® Lavement	non	important / faible	23,66 g + 10,4 g	Sol. rectale (unidose)	A administrer par voie rectale. Ne pas avaler. Rester allongé pendant l'administration.		(!)	
<b>Sorbitol</b> + citrate de sodium + laurylsulfoacétate de sodium	MICROLAX®	non	non remboursé	4,465 g	Sol. rectale (unidose)	A administrer par voie rectale.			
<b>Autres</b>									
<b>Bicarbonate de sodium + bitartrate de potassium</b>	EDUCTYL®	non	insuffisant	0,7 g/1,15 g	Suppositoires effervescent	A administrer par voie rectale.			

Voies digestives et métabolisme	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
---------------------------------	--	-----------	-----	---------	-------------------	----------------------------	---------------------------------	----	----

Anti-diarrhéiques, anti-inflammatoires et anti-infectieux intestinaux

Autres anti-diarrhéiques

Racécadotril	TIORFAN®	non	modéré	100 mg	Gélule	A avaler avec de l'eau. A administrer au début d'un repas. <i>Ouverture possible de la gélule mais goût désagréable.</i>		!/\	!/\
--------------	----------	-----	--------	--------	--------	--	--	-----	-----

Médicaments de la digestion, enzymes incluses

Préparations enzymatiques

Poudre de pancréas	CREON®	non	important	12.000 U 25.000 U 40;000 U	Gélule gastro-résistante	A avaler avec de l'eau. Ouverture possible de la gélule pour mettre les microgranules dans de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer les microgranules. A administrer au cours des repas.	Maintenir une bonne hydratation en période de chaleur.		
--------------------	--------	-----	-----------	----------------------------------	--------------------------	---	--	--	--

Voies digestives et métabolisme	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
---------------------------------	--	-----------	-----	---------	-------------------	----------------------------	---------------------------------	----	----

## Médicaments du diabète

### Insulines et analogues

#### Insulines et analogues pour injection d'action rapide

<b>Insuline asparte<sup>B</sup></b>	NOVORAPID®	non	important	100 U/ml	Sol. injectable (fl.10 ml)	A administrer par voie SC (bolus ou perfusion continue) ou par voie IV. Changer de site à chaque injection : ceinture abdominale, face antérolatérale de la cuisse, région deltoïdienne, quadrant supéro-externe de la fesse. A administrer immédiatement avant un repas.	Conservation : 4 semaines à t° ambiante après première ouverture. <b>Inapproprié selon la liste de Beers 2012 : risque augmenté d'hypoglycémie.</b>		
<b>Insuline asparte<sup>B</sup></b>	NOVORAPID® Flexpen	non	important	100 U/ml	Sol. injectable (stylo 3 ml)	A administrer par voie SC (bolus ou perfusion continue) ou par voie IV. Changer de site à chaque injection : ceinture abdominale, face antérolatérale de la cuisse, région deltoïdienne, quadrant supéro-externe de la fesse. A administrer immédiatement avant un repas.	Conservation : 4 semaines à t° ambiante après première ouverture. <b>Inapproprié selon la liste de Beers 2012 : risque augmenté d'hypoglycémie.</b>		

■ Voies digestives et métabolisme

Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
NOVORAPID® Penfill	non	important	100 U/ml	Sol. injectable (cartouche 3 ml)	A administrer par voie SC (bolus ou perfusion continue) ou par voie IV. Changer de site à chaque injection : ceinture abdominale, face antérolatérale de la cuisse, région deltoïdienne, quadrant supéro-externe de la fesse. A administrer immédiatement avant un repas.	Conservation : 4 semaines à t° ambiante après première ouverture. <b>Inapproprié selon la liste de Beers 2012 : risque augmenté d'hypoglycémie.</b>		
APIDRA®	non	important	100 U/ml	Sol. injectable (fl. 10 ml)	A administrer par voie SC (bolus ou perfusion continue) ou par voie IV. Changer de site à chaque injection : ceinture abdominale, face antérolatérale de la cuisse, région deltoïdienne, quadrant supéro-externe de la fesse. A administrer immédiatement avant un repas.	Conservation : 4 semaines à t° ambiante après première ouverture. <b>Inapproprié selon la liste de Beers 2012 : risque augmenté d'hypoglycémie.</b>		
APIDRA® Solostar	non	important	100 U/ml	Sol. injectable (stylo 3 ml)	A administrer par voie SC (bolus ou perfusion continue) ou par voie IV. Changer de site à chaque injection : ceinture abdominale, face antérolatérale de la cuisse, région deltoïdienne, quadrant supéro-externe de la fesse. A administrer immédiatement avant un repas.	Conservation : 4 semaines à t° ambiante après première ouverture. <b>Inapproprié selon la liste de Beers 2012 : risque augmenté d'hypoglycémie.</b>		

■ Voies digestives et métabolisme	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
<p><b>Insuline glulisine<sup>B</sup></b></p>	<p>APIDRA®</p>	<p>non</p>	<p>important</p>	<p>100 U/ml</p>	<p>Sol. injectable (cartouche 3 ml)</p>	<p>A administrer par voie SC (bolus ou perfusion continue) ou par voie IV. Changer de site à chaque injection : ceinture abdominale, face antérolatérale de la cuisse, région deltoïdienne, quadrant supéro-externe de la fesse. A administrer immédiatement avant un repas.</p>	<p>Conservation : 4 semaines à t° ambiante après première ouverture. <b>Inapproprié selon la liste de Beers 2012 : risque augmenté d'hypoglycémie.</b></p>		
<p><b>Insuline humaine recombinante solution<sup>B</sup></b></p>	<p>UMULINE® Rapide</p>	<p>non</p>	<p>important</p>	<p>100 U/ml</p>	<p>Sol. injectable (fl. 10 ml)</p>	<p>A administrer par voie SC, IM, IV. Changer de site à chaque injection : ceinture abdominale, face antérolatérale de la cuisse, région deltoïdienne, quadrant supéro-externe de la fesse.</p>	<p>Conservation : 4 semaines à t° ambiante après première ouverture. <b>Inapproprié selon la liste de Beers 2012 : risque augmenté d'hypoglycémie.</b></p>		
<p><b>Insuline humaine recombinante solution<sup>B</sup></b></p>	<p>UMULINE® Rapide</p>	<p>non</p>	<p>important</p>	<p>100 U/ml</p>	<p>Sol. injectable (cartouche 3 ml)</p>	<p>A administrer par voie SC, IM, IV. Changer de site à chaque injection : ceinture abdominale, face antérolatérale de la cuisse, région deltoïdienne, quadrant supéro-externe de la fesse.</p>	<p>Conservation : 4 semaines à t° ambiante après première ouverture. <b>Inapproprié selon la liste de Beers 2012 : risque augmenté d'hypoglycémie.</b></p>		

Voies digestives et métabolisme

Spécialités de référence  
Dénomination commerciale

Générique

SMR

Dosages

Formes galéniques

Modalités d'administration


Sélection d'informations utiles

IR

IH

<p><b>Insuline humaine recombinante solution<sup>B</sup></b></p>	<p>ACTRAPID®</p>	<p>non</p>	<p>important</p>	<p>100 U/ml</p>	<p>Sol. injectable (fl. 10 ml)</p>	<p>A administrer par voie SC, IV. Changer de site à chaque injection : ceinture abdominale, face antérolatérale de la cuisse, région deltoïdienne, quadrant supéro-externe de la fesse. A administrer 30 minutes avant un repas.</p>	<p>Conservation : 6 semaines à t° ambiante après première ouverture. Inadapté pour les pompes à insuline : risque de cristallisation. <b>Inapproprié selon la liste de Beers 2012 : risque augmenté d'hypoglycémie.</b></p>		
<p><b>Insuline humaine recombinante solution<sup>B</sup></b></p>	<p>ACTRAPID® Penfill</p>	<p>non</p>	<p>important</p>	<p>100 U/ml</p>	<p>Sol. injectable (cartouche 3 ml)</p>	<p>A administrer par voie SC, IV. Changer de site à chaque injection : ceinture abdominale, face antérolatérale de la cuisse, région deltoïdienne, quadrant supéro-externe de la fesse. A administrer 30 minutes avant un repas.</p>	<p>Conservation : 6 semaines à t° ambiante après première ouverture. Inadapté pour les pompes à insuline : risque de cristallisation. <b>Inapproprié selon la liste de Beers 2012 : risque augmenté d'hypoglycémie.</b></p>		
<p><b>Insuline lispro<sup>B</sup></b></p>	<p>HUMALOG®</p>	<p>non</p>	<p>important</p>	<p>100 U/ml</p>	<p>Sol. injectable (fl. 10 ml)</p>	<p>A administrer par voie SC (bolus ou perfusion continue) ou par voie IV. Changer de site à chaque injection : ceinture abdominale, face antérolatérale de la cuisse, région deltoïdienne, quadrant supéro-externe de la fesse. A administrer immédiatement avant un repas.</p>	<p>Conservation : 4 semaines à t° ambiante après première ouverture. <b>Inapproprié selon la liste de Beers 2012 : risque augmenté d'hypoglycémie.</b></p>		




 Voies digestives et métabolisme	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Insuline lispro <sup>B</sup>	HUMALOG® Pen	non	important	100 U/ml	Sol. injectable (stylo 3 ml)	A administrer par voie SC ou par voie IV. Changer de site à chaque injection : ceinture abdominale, face antérolatérale de la cuisse, région deltoïdienne, quadrant supéro-externe de la fesse. A administrer immédiatement avant un repas.	Conservation : 4 semaines à t° ambiante après première ouverture. <b>Inapproprié selon la liste de Beers 2012 : risque augmenté d'hypoglycémie.</b>		
Insuline lispro <sup>B</sup>	HUMALOG®	non	important	100 U/ml	Sol. injectable (cartouche 3 ml)	A administrer par voie SC (bolus ou perfusion continue) ou par voie IV. Changer de site à chaque injection : ceinture abdominale, face antérolatérale de la cuisse, région deltoïdienne, quadrant supéro-externe de la fesse. A administrer immédiatement avant un repas.	Conservation : 4 semaines à t° ambiante après première ouverture. <b>Inapproprié selon la liste de Beers 2012 : risque augmenté d'hypoglycémie.</b>		

Voies digestives et métabolisme	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
---------------------------------	--	-----------	-----	---------	-------------------	----------------------------	---------------------------------	----	----

### Insulines et analogues pour injection d'action intermédiaire, début d'action rapide

<b>Insuline asparte</b>	NOVOMIX® Penfill	non	important	100 U/ml	Susp. injectable (cartouche 3 ml)	Agiter avant emploi. A administrer par voie SC. Ne pas injecter en IV. Changer de site à chaque injection : ceinture abdominale, face antérolatérale de la cuisse, région deltoïdienne, quadrant supéro-externe de la fesse. A administrer immédiatement avant un repas.	Conservation : 4 semaines à t° ambiante après première ouverture.		
<b>Insuline asparte</b>	NOVOMIX® (30, 50, 70) Flexpen	non	important	100 U/ml	Susp. injectable (stylo 3 ml)	Agiter avant emploi. A administrer par voie SC. Ne pas injecter en IV. Changer de site à chaque injection : ceinture abdominale, face antérolatérale de la cuisse, région deltoïdienne, quadrant supéro-externe de la fesse. A administrer immédiatement avant un repas.	Conservation : 4 semaines à t° ambiante après première ouverture.		

 Voies digestives et métabolisme	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
<b>Insuline humaine recombinante solution et isophane</b>	MIXTARD® 30	non	important	100 U/ml	Susp. injectable (fl. 10 ml)	A administrer par voie SC. Ne pas injecter en IV et en IM. Changer de site à chaque injection : ceinture abdominale, face antérolatérale de la cuisse, région deltoïdienne, quadrant supéro-externe de la fesse. A administrer 30 minutes avant le repas/collation.	Conservation : 6 semaines à t° ambiante après ouverture.		
<b>Insuline lispro</b>	HUMALOG® MIX (25, 50)	non	important	100 U/ml	Susp. injectable (cartouche 3 ml)	A administrer par voie SC. Ne pas injecter en IV. Changer de site à chaque injection : ceinture abdominale, face antérolatérale de la cuisse, région deltoïdienne, quadrant supéro-externe de la fesse. A administrer 15 minutes avant ou après un repas.	Conservation : 4 semaines à t° ambiante après première ouverture.		
<b>Insuline lispro</b>	HUMALOG® MIX (25, 50) kwikpen	non	important	100 U/ml	Susp. injectable (stylo 3 ml)	A administrer par voie SC. Ne pas injecter en IV. Changer de site à chaque injection : ceinture abdominale, face antérolatérale de la cuisse, région deltoïdienne, quadrant supéro-externe de la fesse. A administrer 15 minutes avant ou après un repas.	Conservation : 4 semaines à t° ambiante après première ouverture.		

Voies digestives et métabolisme	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
---------------------------------	--	-----------	-----	---------	-------------------	----------------------------	---------------------------------	----	----

### Insulines et analogues pour injection d'action lente

<b>Insuline détémir</b>	LEVEMIR®	non	important	100 U/ml	Sol. injectable (3 ml : cartouche, FlexPen, Innolet, Penfill)	A administrer par voie SC. Ne pas injecter en IV et IM. Changer de site à chaque injection : ceinture abdominale, face antérolatérale de la cuisse, région deltoïdienne, quadrant supéro-externe de la fesse.	Conservation : 6 semaines à t° ambiante après première ouverture. Inadapté aux pompes à insuline : risque de cristallisation.		
<b>Insuline glargine</b>	LANTUS®	non	important	100 U/ml	Sol. injectable (cartouche 3 ml, fl. 10 ml, Optiset 3 ml, Solostar 3 ml)	A administrer par voie SC. Ne pas injecter en IV. Changer de site à chaque injection : ceinture abdominale, face antérolatérale de la cuisse, région deltoïdienne, quadrant supéro-externe de la fesse.	Conservation : 4 semaines à t° ambiante après première ouverture.		
<b>Insuline humaine recombinante isophane</b>	UMULINE® NPH	non	important	100 U/ml	Susp. injectable (fl. 10 ml, Pen 3 ml, cartouche 3 ml)	A administrer par voie SC et IM. Ne pas injecter en IV. Changer de site à chaque injection : ceinture abdominale, face antérolatérale de la cuisse, région deltoïdienne, quadrant supéro-externe de la fesse.	Conservation : 4 semaines à t° ambiante après première ouverture.		
<b>Insuline humaine recombinante isophane</b>	INSULATARD® NPH	non	important	100 U/ml	Susp. injectable (Flexpen 3 ml, Innolet 3 ml, fl. 10 ml)	A administrer par voie SC. Ne pas injecter en IV. Changer de site à chaque injection : ceinture abdominale, face antérolatérale de la cuisse, région deltoïdienne, quadrant supéro-externe de la fesse.	Conservation : 6 semaines à t° ambiante après première ouverture.		

Voies digestives et métabolisme	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
---------------------------------	--	-----------	-----	---------	-------------------	----------------------------	---------------------------------	----	----

## Antidiabétiques oraux

### Biguanides

<b>Metformine</b>	STAGID®	non	important	700 mg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. Ecrasement possible des comprimés. A administrer au cours ou à la fin d'un repas.		/!	/!
<b>Metformine</b>	GLUCOPHAGE®	oui	important	500 mg 850 mg 1000 mg	Cp. pelliculé sécable	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer au cours ou à la fin des repas.	Si impossibilité d'avalier, préférer la metformine solution buvable.	/!	/!
<b>Metformine</b>	GLUCOPHAGE®	non	important	500 mg 850 mg 1000 mg	Sol. buvable (poudre en sach.)	A dissoudre dans un verre d'eau jusqu'à obtention d'une solution limpide à légèrement opalescente. Remuer la solution et avaler immédiatement. A administrer au cours ou à la fin des repas.		/!	/!

Voies digestives et métabolisme	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
<b>Sulfamides</b>									
<b>Gliclazide</b>	DIAMICRON®	oui	important	30 mg 60 mg	Cp. à libération modifiée	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer au cours d'un repas.		/!!	/!!
<b>Autres</b>									
<b>Répaglinide</b>	NOVONORM®	oui	important	0,5 mg 1 mg 2 mg	Comprimé	A avaler avec de l'eau. A administrer 15 à 30 minutes avant le repas. <i>Ecrasement possible des comprimés.</i>			/!!
<b>Vitamines</b>									
<b>Vitamine D et analogues</b>									
<b>Colécalciférol</b>	UVEDOSE®	non	important	100.000 UI/2 ml	Sol. buvable (amp. 2 ml)	A avaler pur ou dilué dans de l'eau.			
<b>Colécalciférol</b>	ZYMAD®	non	important	200.000 UI/2 ml 80.000 UI/2 ml	Sol. buvable (amp. 2 ml)	A avaler pur ou mélangé à un aliment liquide ou semi-liquide.			

■ Voies digestives et métabolisme	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
<b>Colécalciférol</b>	ZYMAD®	non	important	10.000 UI/1 ml	Sol. buvable en gouttes (fl. 10 ml)	A avaler pur ou mélangé à un aliment liquide ou semi-liquide.	Conservation : 3 mois après ouverture.		
<b>Ergocalciférol</b>	STEROXYL® 15 "A"	non	important	600.000 UI/1,5 ml	Sol. buvable (amp. 1,5 ml)	A diluer dans de l'eau ou du jus de fruit. A administrer par voie orale.	Tenir compte de la teneur en éthanol.		
<b>Ergocalciférol</b>	STEROXYL®	non	important	2.000.000 UI/100 ml	Sol. buvable en gouttes (fl. 20 ml)	A diluer dans de l'eau ou du jus de fruit. A administrer par voie orale.	Tenir compte de la teneur en éthanol. <i>Conservation : 3 mois après ouverture.</i>		
<b>Vitamine C</b>									
<b>Acide ascorbique</b>	VIT. C UPSA®	oui	non remboursé	1 g	Cp. effervescent	A avaler après dissolution dans un verre d'eau.	Tenir compte de la teneur en sodium.		
<b>Acide ascorbique</b>	LAROSCORBINE®	oui	non remboursé	1 g	Cp. effervescent	A avaler après dissolution dans un verre d'eau.	Tenir compte de la teneur en sodium.		

■ Voies digestives et métabolisme

Voies digestives et métabolisme	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
<b>Acide ascorbique</b>	LAROSCORBINE <sup>®</sup> (sans sucre)	oui	non remboursé	500 mg	Cp. à croquer	A croquer avant d'avaler.			
<b>Acide ascorbique</b>	VIT. C UPSA <sup>®</sup>	oui	non remboursé	500 mg	Cp. à croquer	A croquer avant d'avaler.			
<b>Acide ascorbique</b>	VIT. C UPSA <sup>®</sup> (sans sucre)	oui	non remboursé	500 mg	Cp. à croquer	A croquer avant d'avaler.			



Voies digestives et métabolisme	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
---------------------------------	--	-----------	-----	---------	-------------------	----------------------------	---------------------------------	----	----

## Suppléments minéraux

### Calcium

<b>Carbonate de calcium</b>	CALCIDOSE®	oui	important	500 mg (exprimé en calcium)	Susp. buvable (poudre en sach.)	A avaler immédiatement après dissolution dans un verre d'eau. A administrer de préférence à distance des repas.	Tenir compte de la teneur en sucre.	/!	
<b>Carbonate de calcium</b>	OROCAL®	oui	important	500 mg (exprimé en calcium)	Cp. à sucer	A croquer ou à sucer.		/!	

### Calcium en association

<b>Carbonate de calcium + colécalciférol</b>	OROCAL D3®	oui	important	500 mg (exprimé en calcium) + 200 UI  500 mg (exprimé en calcium) + 400 UI	Cp. à sucer	A croquer ou à sucer.		/!	
<b>Carbonate de calcium + colécalciférol</b>	CACIT VITAMINE D3®	non	important	1000 mg (exprimé en calcium) + 880 UI	Sol. buvable (granulés effervescents)	A avaler après dissolution dans un verre d'eau. Agiter avant emploi.		/!	

■ Voies digestives et métabolisme	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
<b>Carbonate de calcium + colécalciférol</b>	CACIT VITAMINE D3®	non	important	500 mg (exprimé en calcium) + 440 UI	Cp. à sucer ou à croquer	A croquer ou à sucer.		⚠	
<b>Carbonate de calcium + colécalciférol</b>	CALTRATE D3®	non	important	600 mg (exprimé en calcium) + 400 UI	Cp. pelliculé sécable	A avaler avec un grand verre d'eau. <i>Ecrasement possible des comprimés.</i>		⚠	

## Potassium

<b>Potassium chlorure</b>	DIFFU K®	non	important	600 mg	Gélule	A avaler avec de l'eau. <i>Ouverture possible de la gélule. Ne pas écraser le contenu. A prendre avec un grand verre d'eau (risque d'ulcération)</i>	Si impossibilité d'avalier, préférer le potassium Richard® sirop.		
<b>Potassium chlorure</b>	KALEORID®	non	important	600 mg 1000 mg	Cp. enrobé à libération prolongée	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer.			
<b>Potassium gluconate</b>	POTASSIUM RICHARD®	non	important	3%	Sirop (unidose 15 ml, fl. 250 ml)	A avaler pur ou dilué avec de l'eau. A administrer à la fin d'un repas.		⚠	
<b>Potassium gluconate</b>	POTASSIUM GLUCO H2P®	non	important	15%	Sirop (fl. 250 ml)	A avaler pur ou dilué avec de l'eau. A administrer à la fin d'un repas.		⚠	

Sang et organes hématopoïétiques	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
----------------------------------	--	-----------	-----	---------	-------------------	----------------------------	---------------------------------	----	----

## Antithrombotiques

### Antivitamines K


<b>Acénocoumarol</b>	MINISINTROM® SINTROM®	non	important	1 mg 4 mg	Comprimé Cp. quadrisécable	A avaler avec de l'eau. <i>A administrer à heure fixe.</i>	Effectuer régulièrement le contrôle biologique (INR). Compléter le carnet de suivi prévu pour le traitement. Vigilance sur les médicaments associés et l'apport alimentaire en vitamine K.	!!	!!
<b>Fluindione</b>	PREVISCAN®	non	important	20 mg	Cp. quadrisécable	A avaler avec de l'eau. <i>A administrer à heure fixe au cours du repas.</i>	Effectuer régulièrement le contrôle biologique (INR). Compléter le carnet de suivi prévu pour le traitement. Vigilance sur les médicaments associés et l'apport alimentaire en vitamine K.	!!	!!

Sang et organes hématopoïétiques	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Warfarine	COUMADINE®	non	important	2 mg 5 mg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. <i>Ecrasement possible des comprimés. A administrer immédiatement après broyage.</i>	Effectuer régulièrement le contrôle biologique (INR). Compléter le carnet de suivi prévu pour le traitement. Vigilance sur les médicaments associés et l'apport alimentaire en vitamine K.	(!)	(!)
Groupe de l'héparine									
Enoxaparine	LOVENOX®	non	important	30.000 UI AXa/3 ml  10.000 UI AXa/1 ml 8.000 UI AXa/0,8 ml 6.000 UI AXa/0,6 ml 4.000 UI AXa/0,4 ml 2.000 UI AXa/0,2 ml	Sol. injectable (flacon multidose)  Sol. injectable (seringue préremplie)	A administrer par voie SC. Ne pas injecter par voie IM. Rester allongé pendant l'administration. Injecter dans la ceinture abdominale et changer de site à chaque injection.	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. Attention au risque de thrombopénie induite par l'héparine.	(!)	(!)

Sang et organes hématopoïétiques	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
<b>Héparine calcique</b>	CALCIPARINE®	non	important	5.000 UI/0,2 ml 7.500 UI/0,3 ml 12.500 UI/0,5 ml 20.000 UI/0,8 ml 25.000 UI/1 ml	Sol. injectable (amp. ou seringue préremplie)	A administrer par voie SC. Ne pas injecter par voie IM. Rester allongé pendant l'administration. Injecter dans la ceinture abdominale. Changer de site à chaque injection.	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. Attention au risque de thrombopénie induite par l'héparine.		
<b>Tinzaparine</b>	INNOHEP®	non	important	18.000 UI AXa/0,9 ml 14.000 UI AXa/0,7 ml 10.000 UI AXa/0,5 ml 4.500 UI AXa/0,45 ml 3.500 UI Axa/0,35 ml 2.500 UI Axa/0,25 ml	Sol. injectable (seringue préremplie)	A administrer par voie IV et SC. Ne pas injecter par voie IM et par voie intravasculaire. Rester allongé pendant l'administration. Injecter dans la ceinture abdominale. Changer de site à chaque injection.	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. Attention au risque de thrombopénie induite par l'héparine.	/!	/!
<b>Inhibiteurs de l'agrégation plaquettaire</b>									
<b>Acide acétylsalicylique</b>	KARDEGIC®	non	important	75 mg 160 mg 300 mg	Sol. buvable (poudre en sach.)	A avaler après dissolution dans de l'eau.	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK.	/!	

Sang et organes hématopoïétiques	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH	
	Clopidogrel	PLAVIX®	oui non	important	75 mg 300 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. A administrer à heure fixe. <i>Ecrasement possible des comprimés. Principe actif sensible à la lumière.</i>	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK.	/!	/!
Autre antithrombotique										
	Fondaparinux	ARIXTRA®	non	important	10 mg/0,8 ml 7,5 mg/0,6 ml 5 mg/0,4 ml 2,5 mg/0,5 ml	Sol. injectable (seringue préremplie)	A administrer par voie SC profonde. Ne pas injecter par voie IM. Rester allongé pendant et après l'administration. Injecter dans la ceinture abdominale. Changer de site à chaque injection.	/!	/!	
Antihémorragiques										
Vitamine K										
	Phytoménadione	VITAMINE K1®	non	important	10 mg/1 ml	Sol. buvable et injectable (amp. 1 ml)	A administrer par voie orale ou injectable (IV ou IM) suivant la prescription.	Ne pas utiliser une ampoule dont le contenu serait devenu trouble ou présenterait deux phases séparées.		

Sang et organes hématopoïétiques	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Préparations antianémiques									
Préparations martiales									
Fumarate ferreux <sup>B</sup>	FUMAFER®	non	important	66 mg (exprimé en fer)	Cp. pelliculé	A administrer en plusieurs prises par jour. L'horaire et la répartition des prises est à adapter en fonction de la tolérance digestive.	<p>La consommation importante de thé inhibe l'absorption de fer.  <i>Si impossibilité d'avaler, préférer le FUMAFER® en poudre orale.</i></p> <p><b>Inapproprié selon la liste de Beers à des doses &gt; à 325 mg de sulfate ferreux/j (soit en fer 120 mg) : la quantité absorbée n'augmente pas de façon systématique mais le risque de constipation est plus élevé.</b></p>		

 Sang et organes  
hématopoïétiques

Spécialités de  
référence  
Dénomination  
commerciale

Générique

SMR

Dosages

Formes galéniques

Modalités d'administration

Sélection d'informations  
utiles

IR

IH

**Fumarate ferreux<sup>B</sup>**

FUMAFER®

non

important

33 mg/1 g  
(exprimé en fer)

Poudre orale  
(fl. 50 g)

Utiliser la cuillère mesure pour  
prélever la poudre.  
A avaler après dilution dans  
l'eau.  
A administrer avant un repas.

Tenir compte de la teneur  
en sucre.  
La consommation  
importante de thé inhibe  
l'absorption de fer.  
Conservation : 60 jours  
après ouverture.  
**Inapproprié selon la liste de  
Beers à des doses > à 325  
mg de sulfate ferreux/j (soit  
en fer 120 mg) : la quantité  
absorbée n'augmente pas  
de façon systématique mais  
le risque de constipation est  
plus élevé.**

**Sulfate ferreux<sup>B</sup>**

TARDYFERON®

non

important


80 mg  
(exprimé en fer)

Cp. enrobé

A avaler avec de l'eau.  
A administrer avant les repas.

La consommation  
importante de thé inhibe  
l'absorption de fer.  
*Si impossibilité d'avalier,  
préférer le FUMAFER® en  
poudre orale.*  
**Inapproprié selon la liste de  
Beers à des doses > à 325  
mg de sulfate ferreux/j (soit  
en fer 120 mg) : la quantité  
absorbée n'augmente pas  
de façon systématique mais  
le risque de constipation est  
plus élevé.**






 Sang et organes hématopoïétiques	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH																														
<b>Sulfate ferreux<sup>B</sup></b> + <b>acide folique</b>	TARDYFERON B9®	non	important	50 mg (exprimé en fer) + 0,35 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. A administrer avant les repas.	La consommation importante de thé inhibe l'absorption de fer. <b>Inapproprié selon la liste de Beers à des doses &gt; à 325 mg de sulfate ferreux/j (soit en fer 120 mg) : la quantité absorbée n'augmente pas de façon systématique mais le risque de constipation est plus élevé.</b>																																
<b>Vitamine B12 et acide folique</b>										<b>Acide folique</b>	SPECIAFOLDINE®	oui	important	0,4 mg 5 mg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. <i>Ecrasement possible des comprimés.</i>				<b>Cyanocobalamine</b>	VITAMINE B12®	non	important	250 µg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. <i>Ecrasement possible des comprimés mais administration immédiate car le principe actif est sensible à la lumière.</i>	Si impossibilité d'avaler, préférer la forme solution buvable.			<b>Cyanocobalamine</b>	VITAMINE B12®	non oui non	important	0,1 mg/1 ml 1 mg/2 ml 1 mg/4 ml	Sol. buvable et injectable (amp. 1, 2, 4 ml)	Voie IM ou orale selon l'indication. Par voie orale : à avaler après dissolution dans un verre d'eau.			
<b>Acide folique</b>	SPECIAFOLDINE®	oui	important	0,4 mg 5 mg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. <i>Ecrasement possible des comprimés.</i>																																	
<b>Cyanocobalamine</b>	VITAMINE B12®	non	important	250 µg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. <i>Ecrasement possible des comprimés mais administration immédiate car le principe actif est sensible à la lumière.</i>	Si impossibilité d'avaler, préférer la forme solution buvable.																																
<b>Cyanocobalamine</b>	VITAMINE B12®	non oui non	important	0,1 mg/1 ml 1 mg/2 ml 1 mg/4 ml	Sol. buvable et injectable (amp. 1, 2, 4 ml)	Voie IM ou orale selon l'indication. Par voie orale : à avaler après dissolution dans un verre d'eau.																																	

	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
--	--	-----------	-----	---------	-------------------	----------------------------	---------------------------------	----	----

Médicaments en cardiologie

Glucosides cardiotoniques

Digoxine <sup>PBL</sup>	HEMIGOXINE® DIGOXINE®	non	important	0,125 mg 0,25 mg	Comprimé	A avaler avec de l'eau. <i>A administrer au cours des repas.</i>	Si impossibilité d'avaler, préférer la forme buvable. <b>Inapproprié selon la liste Priscus, de Beers 2012 (dose &gt; à 0,125 mg/j) et de Laroche (dose &gt; à 0,125 mg/j et ou concentration sérique &gt; à 1,2 ng/ml). Les sujets âgés sont plus sensibles à la digoxine. La réduction de la fonction rénale peut entraîner une diminution de la clairance du produit et un risque de toxicité. Surveiller la digoxinémie, adapter les doses. Autres alternatives possible : bêta-bloquants, diurétiques, IEC.</b>		
-------------------------	--------------------------	-----	-----------	---------------------	----------	---	--	---	---

 Système cardiovasculaire	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
<b>Digoxine</b> <sup>BLP</sup>	DIGOXINE®	non	important	5 µg/0,1 ml	Sol. buvable en gouttes (fl. 60ml)	A administrer directement dans la bouche à l'aide de la pipette-doseuse.	Tenir compte de la présence d'éthanol. <i>Conservation : 2 mois à t° ambiante après ouverture.</i> <b>Inapproprié selon la liste Priscus, de Beers 2012 (dose &gt; à 0,125 mg/j) et de Laroche (dose &gt; à 0,125 mg/j et ou concentration sérique &gt; à 1,2 ng/ml). Les sujets âgés sont plus sensibles à la digoxine. La réduction de la fonction rénale peut entraîner une diminution de la clairance du produit et un risque de toxicité. Surveiller la digoxinémie, adapter les doses. Autres alternatives possible : bêta-bloquants, diurétiques, IEC.</b>	(!)	(!)
<b>Antiarythmiques</b>									
<b>Classe III</b>									
<b>Amiodarone</b> <sup>B</sup>	CORDARONE®	oui	important	200 mg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. <i>Ecrasement possible des comprimés.</i>	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. Tenir compte de la présence d'iode. <b>Eviter l'exposition solaire. Inapproprié selon la liste de Beers : modification de l'intervalle QT et risque de torsades de pointe. Manque d'efficacité chez le sujet âgé.</b>		

 Système cardiovasculaire	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
--	--	-----------	-----	---------	-------------------	----------------------------	---------------------------------	----	----


## Vasodilatateurs en cardiologie

### Dérivés nitrés

#### Dérivés nitrés à action immédiate

<b>Isosorbide dinitrate</b>	ISOCARD®	non	important	1%	Sol. sublinguale (fl. pulvérisateur 20 ml)	Voie sublinguale. Pulvériser sur la muqueuse buccale, sous la langue, sans inhaler. En cas de renouvellement, conseiller au patient de s'asseoir et de rester assis pendant une dizaine de minutes après la deuxième administration.			
<b>Trinitrine</b>	NATISPRAY®	non	important	0,15 mg 0,30 mg	Sol. pour pulvérisation buccale (fl. 13,5 et 18 ml)	Voie sublinguale. Pulvériser sur la muqueuse buccale, sous la langue, sans inhaler. En cas de renouvellement, conseiller au patient de s'asseoir et de rester assis pendant une dizaine de minutes après la deuxième administration.			

 Système cardiovasculaire	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH										
<b>Trinitrine</b>	TRINITRINE SIMPLE®	non	important	0,15 mg	Pilule enrobée	Voie sublinguale. A croquer et à garder dans la bouche. En cas de renouvellement, conseiller au patient de s'asseoir et de rester assis pendant une dizaine de minutes après la deuxième administration.													
<b>Dérivés nitrés à action prolongée</b>										<b>Isosorbide mononitrate</b>	MONICOR®	non	important	20 mg 40 mg 60 mg	Gélule à libération prolongée (microgranules)	A avaler avec de l'eau. Ne pas ouvrir la gélule. Ne pas écraser, ne pas croquer. <i>Ouverture possible de la gélule mais attention ne pas écraser les microgranules.</i> A administrer immédiatement après ouverture.	Respecter un intervalle libre d'au moins 12h entre deux prises.		
<b>Isosorbide mononitrate</b>	MONICOR®	non	important	20 mg 40 mg 60 mg	Gélule à libération prolongée (microgranules)	A avaler avec de l'eau. Ne pas ouvrir la gélule. Ne pas écraser, ne pas croquer. <i>Ouverture possible de la gélule mais attention ne pas écraser les microgranules.</i> A administrer immédiatement après ouverture.	Respecter un intervalle libre d'au moins 12h entre deux prises.												

 Système cardiovasculaire	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
<b>Trinitrine</b>	NITRIDERM TTS® DIAFUSOR® CORDIPATCH® DISCOTRINE® EPINITRIL® TRINIPATCH®	oui	important	5 mg/24h 10 mg/24h 15 mg/ 24h (pas de générique pour ce dosage)	Dispositif transdermique	A appliquer sur peau sèche et propre, non irritée, non écorchée. Ne pas couper les dispositifs. Ne recoller un dispositif au même endroit qu'après plusieurs jours.	Respecter un intervalle libre d'au moins 8h entre deux patches.		
Autres vasodilatateurs en cardiologie									
<b>Molsidomine</b>	CORVASAL®	oui	important	2 mg 4 mg	Cp. sécable Comprimé	A avaler avec de l'eau. <i>Ecrasement possible des comprimés. A administrer immédiatement après broyage (principe actif photosensible).</i> A administrer au cours des repas.			/!
<b>Nicorandil</b>	ADANCOR® IKOREL®	oui	important	10 mg 20 mg	Cp. sécable Comprimé	A avaler avec de l'eau. <i>Ecrasement possible des comprimés. A administrer immédiatement après broyage.</i>			

 Système cardiovasculaire	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
---	--	-----------	-----	---------	-------------------	----------------------------	---------------------------------	----	----


## Diurétiques

### Diurétiques du tube distal, thiazidiques


<b>Hydrochlorothiazide</b>	ESIDREX®	non	important	25 mg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. <i>Ecrasement possible des comprimés. Goût désagréable, à administrer immédiatement après broyage, sur un aliment semi-solide. Ne pas dissoudre au préalable.</i>		/!!	/!!
----------------------------	----------	-----	-----------	-------	-------------	--	--	-----	-----

### Diurétiques du tube distal, non thiazidiques

<b>Ciclétanine</b>	TENSTASTEN®	oui	important	50 mg	Gélule	A avaler avec de l'eau. Ouverture possible de la gélule.		/!!	/!!
<b>Indapamide</b>	FLUDEX®	oui	important	2,5 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer, ni sucer. <i>Ecrasement possible des comprimés. A administrer en suspension après broyage.</i>		/!!	/!!
<b>Indapamide</b>	FLUDEX®	oui	important	1,5 mg	Cp. pelliculé à libération prolongée	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer.		/!!	/!!

 Système cardiovasculaire	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Diurétiques de l'anse									
Bumétanide	BURINEX®	non	important	1 mg 5 mg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. <i>Ecrasement possible des comprimés. Administrer immédiatement après broyage (principe actif photosensible).</i>		/!!	/!!
Furosémide	LASILIX®	oui	important	10 mg/ml	Sol. buvable (fl. 60 ml)	A avaler pur à l'aide de la pipette doseuse. Possibilité de diluer dans un demi verre d'eau.	Tenir compte de la teneur en éthanol. Conservation : 6 semaines après ouverture.	/!!	/!!
Furosémide	LASILIX FAIBLE® LASILIX® LASILIX SPECIAL®	non	important	20 mg 40 mg 500 mg	Comprimé Cp. sécable Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. <i>Ecrasement possible des comprimés. Administrer immédiatement après broyage (principe actif photosensible).</i>	Si impossibilité d'avalier, préférer la solution buvable.	/!!	/!!



 Système cardiovasculaire	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Furosémide	LASILIX RETARD®	oui	important	60 mg	Gélule à libération prolongée (microgranules)	A avaler avec de l'eau. A administrer à jeun. Ne pas écraser, ne pas croquer. <i>Ouverture possible des gélules. Ne pas écraser le contenu.</i>		!!	!!
<b>Diurétiques épargneurs potassiques</b>									
Spironolactone <sup>B</sup>	ALDACTONE®	oui	important / insuffisant	25 mg 50 mg 75 mg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. <i>Ecrasement possible des comprimés. Goût très désagréable, mettre en suspension dans un liquide.</i>	Inapproprié selon la liste de Beers 2012 à une dose > à 25 mg/j. Dans l'IC, risque d'hyperkaliémie augmenté chez le sujet âgé notamment en cas de dose > à 25 mg/j ou association à un AINS, un IEC, un ARA II, une supplémentation en potassium. A éviter en cas d'IC ou de clairance de la créatinine < 30 ml/min.	!!	!!
<b>Diurétiques et épargneurs potassiques en association</b>									
Spironolactone + altizide	ALDACTAZINE®	oui	important	25 mg + 15 mg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. <i>A administrer au cours ou en fin de repas.</i>		!!	!!

 Système cardiovasculaire	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
---	--	-----------	-----	---------	-------------------	----------------------------	------------------------------------	----	----

## Vasculoprotecteurs


### Médicaments pour traitement des hémorroïdes


Oxyde de zinc + dioxyde de titane + carraghénate	TITANOREINE®	non	insuffisant	2 g/100 g + 2 g/100 g + 2,50 g/100 g	Crème rectale (tb. 40 g)	A administrer par voie rectale.			
Oxyde de zinc + dioxyde de titane + carraghénate	TITANOREINE®	non	insuffisant	0,40 g + 0,20 g + 0,30 g	Suppositoire	A administrer par voie rectale.			
Oxyde de zinc + dioxyde de titane + carraghénate + lidocaïne	TITANOREINE® à la lidocaïne	non	insuffisant	2 g/100 g + 2 g/100 g + 2,50 g/100 g + 2 g/100 g	Crème rectale (tb. 20 g)	A administrer par voie rectale.			


## Bétabloquants

### Bétabloquants non cardiosélectifs

Acébutolol	SECTRAL®	oui	important	200 mg 400 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer.	Si impossibilité d'avaler, préférer la solution buvable.	/\	
------------	----------	-----	-----------	------------------	---------------	---	---	----	--


	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
<b>Acébutolol</b>	SECTRAL®	non	important	500 mg	Cp. pelliculé à libération prolongée	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer.	Si impossibilité d'avalier, préférer la solution buvable.	/!\	
<b>Acébutolol</b>	SECTRAL®	non	important	40 mg/ml	Sol. buvable (fl. 125 ml)	A administrer par voie orale. Utiliser la seringue doseuse.	Tenir compte de la teneur en éthanol.	/!\	
<b>Propranolol</b>	AVLOCARDYL®	oui	important	40 mg	Cp. quadrisécable	A avaler avec de l'eau. <i>Ecrasement possible des comprimés.</i> <i>A administrer pendant les repas.</i>		/!\	/!\
<b>Propranolol</b>	AVLOCARDYL®	oui	important	160 mg	Gélule à libération prolongée (microgranules)	A avaler avec de l'eau. Ne pas ouvrir la gélule. Ne pas écraser, ne pas croquer. <i>Ouverture possible de la gélule. Ne pas écraser le contenu.</i>		/!\	/!\

	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
<p><b>Sotalol<sup>P</sup></b></p>	SOTALEX®	oui	important	80 mg 160 mg	Cp. sécable	<p>A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. <i>Ecrasement possible des comprimés.</i></p>	<p>Inapproprié selon la liste Priscus : bêta-bloquant avec des effets antiarythmiques. Autres alternatives disponibles : bêta-bloquants cardiosélectifs (ex: bisoprolol, métoprolol, carvedilol), amiodarone. Surveillance des fonctions cardiovasculaire, pulmonaire et ajustement à la fonction rénale. Il est recommandé de commencer à la demi-dose de la dose usuelle et d'augmenter progressivement.</p>	/!\	
<p><b>Bétabloquants cardiosélectifs</b></p>									
<p><b>Aténolol</b></p>	TENORMINE®	oui	important	50 mg 100 mg	Cp. pelliculé sécable	<p>A avaler avec de l'eau. <i>Ecrasement possible des comprimés.</i></p>		/!\	/!\
<p><b>Bisoprolol</b></p>	CARDENSIEL®	oui	important	1,25 mg 2,5 mg 3,75 mg 5 mg 7,5 mg	Cp. pelliculé sécable (sauf le 1,25 mg)	<p>A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. <i>Ecrasement possible des comprimés. Goût amer. A administrer immédiatement après broyage.</i></p>		/!\	/!\

 Système cardiovasculaire	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
<b>Bisoprolol</b>	CARDENSIEL® DETENSIEL®	oui	important	10 mg	Cp. pelliculé sécable	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. <i>Ecrasement possible des comprimés. Goût amer. A administrer immédiatement après broyage.</i>		(!)	(!)
<b>Céliprolol</b>	CELECTOL®	oui	important	200 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. A administrer à jeun.		(!)	(!)
<b>Métoprolol</b>	SELOKEN® LOPRESSOR®	oui	important	100 mg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. A administrer au cours d'un repas. <i>Ecrasement possible des comprimés.</i>			(!)
<b>Métoprolol</b>	SELOKEN® LOPRESSOR®	non	important	200 mg	Cp. pelliculé à libération prolongée	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer au cours d'un repas.	Si impossibilité d'avaler, préférer la forme comprimé écrasable.		(!)
<b>Néбиволol</b>	TEMERIT® NEBILOX®	oui	important	5 mg	Cp. quadrisécable	A avaler avec de l'eau. A administrer à heure fixe. <i>Ecrasement possible des comprimés.</i>		(!)	(!)

	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Alpha et bêtabloquant									
<b>Carvédilol</b>	KREDEX®	oui	important	6,25 mg 12,5 mg 25 mg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. A administrer à heure fixe au cours d'un repas.		/!	/!
Inhibiteurs calciques									
Inhibiteurs calciques avec effets vasculaires prédominants									
<b>Amlodipine</b>	AMLOR®	oui	important	5 mg 10 mg	Gélule	A avaler avec de l'eau. <i>Ouverture possible des gélules, ne pas écraser le contenu.</i>			/!
<b>Lercanidipine</b>	LERCAN® ZANIDIP®	oui	important	10 mg 20 mg	Cp. pelliculé sécable Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. A administrer à heure fixe avant le repas.	Ne pas administrer avec du jus de pamplemousse.	/!	/!
<b>Nicardipine<sup>L</sup></b>	LOXEN®	non	important	20 mg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer 30 minutes avant un repas.	Inapproprié selon la liste de Laroche : risque d'hypotension orthostatique, d'accident coronaire ou cérébral. Autres alternatives thérapeutiques disponibles : autres anti-hypertenseurs, sauf anti-hypertenseurs à action centrale.		

	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Nicardipine <sup>L</sup>	LOXEN®	non	important	50 mg	Gélule à libération prolongée (microgranules)	A avaler avec de l'eau. Ne pas ouvrir la gélule. Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer avant un repas.	Inapproprié selon la liste de Laroche : risque d'hypotension orthostatique, d'accident coronaire ou cérébral. Autres alternatives thérapeutiques disponibles : autres anti-hypertenseurs, sauf anti-hypertenseurs à action centrale.		
Inhibiteurs calciques avec effets cardiaques et vasculaires									
Diltiazem	MONO TILDIEM®	non	important	200 mg 300 mg	Gélule à libération prolongée	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. <i>Ouverture possible des gélules. A administrer rapidement après ouverture, ne pas broyer les microgranules. A administrer au cours d'un repas.</i>		/!	/!
Diltiazem	TILDIEM®	oui	important	60 mg	Comprimé	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer au début d'un repas.		/!	/!

 Système cardiovasculaire	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Vérapamil	ISOPTINE®	oui	important	40 mg	Cp. enrobé	A avaler avec de l'eau. A administrer au cours d'un repas. <i>Ecrasement possible des comprimés.</i>			/!
Vérapamil	ISOPTINE®	oui	important	120 mg	Gélule	A avaler avec de l'eau. A administrer au cours d'un repas. <i>Ouverture possible des gélules.</i>			/!
Vérapamil	ISOPTINE®	oui	important	240 mg	Cp. sécable à libération prolongée	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer au cours d'un repas.	Si impossibilité d'avaler, préférer les comprimés ou gélules.		/!


### Médicaments agissant sur le système rénine-angiotensine

#### Inhibiteurs de l'enzyme de conversion non associés

Enalapril	RENITEC®	oui	important	5 mg 20 mg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau.		/!	/!
Lisinopril	ZESTRIL®	oui	important	5mg 20 mg	Cp. sécable (20 mg non sécable)	A avaler avec de l'eau. A administrer à heure fixe. <i>Ecrasement possible des comprimés.</i>		/!	/!



 Système cardiovasculaire	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Périndopril	COVERSYL®	oui	important	2,5 mg (générique dosé à 2 mg) 5 mg (générique dosé à 4mg) 10mg (générique dosé à 8 mg)	Cp. pelliculé Cp. pelliculé sécable Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. A administrer à heure fixe avant un repas. <i>Ecrasement possible des comprimés.</i>		⚠	⚠
Ramipril	TRIATEC®	oui	important	1,25 mg 2,5 mg 5 mg 10 mg	Comprimé Cp. sécable Cp. sécable Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer à heure fixe.	Si impossibilité d'avaler, préférer les autres IEC pouvant être écrasés (périndopril, lisinopril).	⚠	⚠
Inhibiteurs de l'enzyme de conversion associés									
Bénazépril + hydrochlorothiazide	CIBADREX®	oui	important	10 mg + 12,50 mg	Cp. pelliculé sécable	A avaler avec de l'eau.		⚠	⚠
Lisinopril + hydrochlorothiazide	ZESTORETIC®	oui	important	20 mg + 12,50 mg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. A administrer à heure fixe. <i>Ecrasement possible des comprimés. Goût désagréable.</i>		⚠	⚠


 Système cardiovasculaire	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
<b>Périndopril + indapamide</b>	PRETERAX®	oui	important	2 mg + 0,625 mg  2,50 mg + 0,625 mg	Cp. sécable  Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. A administrer avant un repas. <i>Ecrasement possible des comprimés.</i>		/!\	/!\
<b>Périndopril + indapamide</b>	BIPRETERAX®	oui	important	4 mg + 1,25 mg  5 mg + 1,25 mg  10 mg + 2,50 mg	Comprimé  Cp. pelliculé  Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. A administrer avant un repas. <i>Ecrasement possible des comprimés.</i>		/!\	/!\


 Système cardiovasculaire	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
--	--	-----------	-----	---------	-------------------	----------------------------	---------------------------------	----	----

Antagonistes de l'angiotensine II (ARA II)

ARA II non associés

<b>Candésartan</b>	ATACAND® KENZEN®	non	important	4 mg 8 mg 16 mg 32 mg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. A administrer à heure fixe. <i>Ecrasement possible des comprimés.</i>		/!	/!
<b>Irbésartan</b>	APROVEL®	non	important	75 mg 150 mg 300 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer à heure fixe.			/!
<b>Losartan</b>	COZAAR®	oui	important	50 mg 100 mg	Cp. pelliculé sécable Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. A administrer à heure fixe. <i>A administrer avant le repas.</i>		/!	/!
<b>Losartan</b>	COZAAR®	non	important	2,5 mg/ml	Susp. buvable (poudre et solvant)	Agiter avant emploi. Utiliser la seringue pour l'administration. A administrer à heure fixe.	Conservation : 4 semaines entre 2°C et 8°C après reconstitution.	/!	/!
<b>Valsartan</b>	TAREG® NISIS®	oui	important	40 mg 80 mg 160 mg	Cp. pelliculé sécable	A avaler avec de l'eau. A administrer à heure fixe.			/!

 Système cardiovasculaire	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Valsartan	TAREG®	non	important	3 mg/ml	Sol. buvable (fl 160 ml)	Utiliser la seringue pour prélever la solution. Prendre un verre d'eau après la prise. A administrer à heure fixe.	Conservation : 3 mois à t° ambiante après ouverture.		⚠
ARA II associés									
Valsartan + hydrochlorothiazide	COTAREG® NISISCO®	oui	important	80 mg + 12,5 mg 160 mg + 12,5 mg 160 mg + 25 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. A administrer à heure fixe.		⚠	⚠
Agents modifiant les lipides									
Inhibiteurs de l'HMG-CoA réductase									
Atorvastatine	TAHOR®	non	important	10 mg 20 mg	Cp. à croquer	A avaler entier avec de l'eau ou croquer.	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK.		⚠
Atorvastatine	TAHOR®	non	important	10 mg 20 mg 40 mg 80 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. <i>Ecrasement possible des comprimés.</i>	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK.		⚠

 Système cardiovasculaire	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
<b>Pravastatine</b>	VASTEN® ELISOR®	oui	important	10 mg 20 mg 40 mg	Cp. sécable (VASTEN® 40 mg non sécable)	A avaler avec de l'eau à distance des autres traitements. <i>Ecrasement possible des comprimés. A administrer immédiatement après broyage.</i>	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK.	/!\	/!\
<b>Rosuvastatine</b>	CRESTOR®	non	important	5 mg 10 mg 20 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer à heure fixe.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. <i>Si impossibilité d'avalier, préférer une autre statine (TAHOR®, VASTEN®, ELISOR®).</i>	/!\	/!\
<b>Simvastatine</b>	ZOCOR®	non	important	5 mg 20 mg	Cp. pelliculé Cp. sécable	A avaler avec de l'eau.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. Déconseillé avec du jus de pamplemousse.	/!\	/!\
<b>Simvastatine</b>	LODALES® ZOCOR®	oui	important	20 mg 40 mg	Cp. enrobé Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. Déconseillé avec du jus de pamplemousse.	/!\	/!\

■ Médicaments  
dermatologiques

Spécialités de  
référence  
Dénomination  
commerciale

Générique

SMR

Dosages

Formes galéniques

Modalités d'administration

Sélection d'informations  
utiles

IR IH


## Antifongiques à usage dermatologique

### Antifongiques à usage topique

#### Dérivés imidazolés et triazolés

<b>Bifonazole</b>	AMYCOR®	non	modéré	1%	Crème (tb. 15 g)	A appliquer sur la peau propre et sèche. Utiliser en massage. Se laver les mains après utilisation.			
<b>Bifonazole</b>	AMYCOR®	non	modéré	1%	Poudre (fl. poudreux 15 g)	A appliquer sur la peau propre et sèche. Se laver les mains après utilisation.			

 Médicaments dermatologiques	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
<b>Bifonazole</b>	AMYCOR®	non	modéré	1%	Solution (fl. pulvérisateur 15 g)	A appliquer sur la peau propre et sèche. Se laver les mains après utilisation.			
<b>Econazole</b>	PEVARYL®	oui	modéré	1%	Crème (tb. 30 g)	A appliquer sur la zone à traiter sur peau sèche. Utiliser en massage. Se laver les mains après application.	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. Il est déconseillé d'utiliser un savon à pH acide (favorise la multiplication du Candida).		
<b>Econazole</b>	PEVARYL®	oui	modéré	1%	Emulsion fluide (fl. 30 ml)	A agiter avant emploi.	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. Il est déconseillé d'utiliser un savon à pH acide (favorise la multiplication du Candida).		
<b>Econazole</b>	PEVARYL®	oui	modéré	1%	Poudre (fl. poudreur 30 g)	A appliquer sur la zone à traiter sur peau sèche. Se laver les mains après application.	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. Il est déconseillé d'utiliser un savon à pH acide (favorise la multiplication du Candida).		

 Médicaments dermatologiques	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Econazole	PEVARYL®	oui	modéré	1%	Solution (fl. pulvérisateur 30 g)	A agiter avant emploi. A appliquer sur la zone à traiter sur peau sèche, propre. Utiliser en massage. Se laver les mains après application.	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. Il est déconseillé d'utiliser un savon à pH acide (favorise la multiplication du Candida).		
Kétoconazole	KETODERM®	non	modéré	2%	Crème (tb. 15 g)	Voie cutanée.	Il est déconseillé d'utiliser un savon à pH acide (favorise la multiplication du Candida).		
Kétoconazole	KETODERM®	oui	modéré	2%	Gel (unidose, sach.)	Appliquer la totalité de la dose sur toute la surface du corps y compris le cuir chevelu, éventuellement à l'aide d'un gant humide. Faire mousser le gel, en insistant sur les zones atteintes. Laisser en place 5 minutes minimum. Rincer soigneusement. Ne pas avaler.	Il est déconseillé d'utiliser un savon à pH acide (favorise la multiplication du Candida).		



Autres antifongiques


<b>Amorolfine</b>	LOCERYL®	oui	modéré	5%	Vernis à ongles médicamenteux (fl. 2,5 ml)	Avant la première application de ce médicament, faire une toilette soigneuse des ongles, limer la zone atteinte de l'ongle, aussi complètement que possible. Nettoyer la surface de l'ongle et la dégraisser au moyen de dissolvant. Appliquer le vernis à l'aide d'une des spatules réutilisables sur la totalité de l'ongle atteint. Nettoyer la spatule réutilisable entre chaque passage d'un ongle à l'autre, afin d'éviter la contamination du vernis. Ne pas essuyer la spatule sur le bord du flacon.			
<b>Ciclopirox olamine</b>	MYCOSTER®	non	modéré	1%	Crème (tb. 30 g)	Voie cutanée.	Il est déconseillé d'utiliser un savon à pH acide (favorise la multiplication de candida).		
<b>Ciclopirox olamine</b>	MYCOSTER®	non	modéré	1%	Poudre (fl. poudreux 30 g)	Voie cutanée.	Il est déconseillé d'utiliser un savon à pH acide (favorise la multiplication de candida).		

Médicaments dermatologiques	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
<b>Ciclopirox olamine</b>	MYCOSTER®	non	modéré	1%	Solution (fl. 30 ml)	Voie cutanée.	Il est déconseillé d'utiliser un savon à pH acide (favorise la multiplication de candida).		
<b>Ciclopirox base</b>	MYCOSTER®	oui	modéré	8%	Vernis à ongles médicamenteux (fl. 3 ml)	A appliquer sur tous les ongles infectés. Le vernis médicamenteux doit être appliqué sur l'ensemble du plateau unguéal. Bien refermer le flacon après chaque utilisation.	Il est déconseillé d'utiliser un savon à pH acide (favorise la multiplication de candida).		

## Emollients et protecteurs

### Médicaments à base d'oxyde de zinc

<b>Oxyde de zinc</b>	OXYPLASTINE®	non	insuffisant	46%	Pommade (tb. 135 g)	Voie cutanée.			
<b>Oxyde de zinc + glycérol + talc</b>	ALOPLASTINE®	non	faible	25% + 20% + 25%	Pâte (tb. 90, 200 g)	A appliquer en couche épaisse sur toute la zone à protéger.			

 Médicaments dermatologiques	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
	<b>Oxyde de zinc + huile de foie de poisson</b>	MITOSYL®	non	insuffisant	20% + 27%	Pommade (tb. 20, 65, 150 g)	A appliquer sur la zone à traiter. Utiliser en massage.	Ne pas appliquer sous pansement occlusif. Ne pas utiliser avec ou après un antiseptique aux propriétés oxydantes (exemple : eau oxygénée).	
<b>Paraffine et produits gras</b>									
	<b>Cérat de Galien</b>	CERAT DE GALIEN COOPER®				Voie cutanée. Etaler sur la zone à protéger.			
	<b>Glycérol + vaseline + paraffine liquide</b>	DEXERYL®	non	faible / insuffisant	15% + 8% + 2%	Crème (tb. 50, 250 g)	A appliquer en couche mince.		
	<b>Vaseline</b>	VASELINE® officinale, pure codex, stérilisée	non	non remboursé	100%	Pommade (tb. 20, 45, 60, 80 g)	Voie cutanée. Etaler sur la zone à protéger.		
<b>Autres émoullients et protecteurs</b>									
	<b>Triéthanolamine</b>	BIAFINE®	oui	insuffisant	0.67%	Emulsion (tb. 93,186 g)	A appliquer en couche épaisse sur la zone à traiter. Utiliser en massage.		

Médicaments dermatologiques	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
-----------------------------	--	-----------	-----	---------	-------------------	----------------------------	---------------------------------	----	----

Médicaments contre le psoriasis

Médicaments à usage topique

<b>Calcipotriol</b>	DAIVONEX®	non	important	50 µg/g	Crème (tb. 30, 120 g)	A appliquer sur la zone à traiter en couche mince. Se laver les mains après application.			
<b>Calcipotriol + bétaméthasone</b>	DAIVOBET®	non	important	50 µg/g + 0,5 mg/g	Gel (tb. 60 g)	Agiter avant emploi. A appliquer en couche mince, utiliser en massage. Ne pas rincer après application. Se laver les mains avant et après application.		/!\	/!\
<b>Calcipotriol + bétaméthasone</b>	DAIVOBET®	non	important	50 µg/g + 0,5 mg/g	Pommade (tb. 60 g)	Agiter avant emploi. A appliquer en couche mince, utiliser en massage. Ne pas rincer après application. Se laver les mains avant et après application.		/!\	/!\

Médicaments dermatologiques	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
-----------------------------	--	-----------	-----	---------	-------------------	----------------------------	---------------------------------	----	----

Antibiotiques et chimiothérapies à usage dermatologique

Antibiotiques à usage topique

Acide fusidique	FUCIDINE®	oui	modéré	2%	Crème (tb. de 15 g)	Applications locales avec ou sans pansement après nettoyage de la surface infectée. Eviter l'application en couche épaisse. La forme crème est plus particulièrement adaptée aux lésions suintantes, macérées, et des plis.			
Acide fusidique	FUCIDINE®	oui	modéré	2%	Pommade (tb.15 g)	Applications locales avec ou sans pansement après nettoyage de la surface infectée. Eviter l'application en couche épaisse. Ne pas utiliser la forme pommade sur les lésions suintantes macérées, ni dans les plis, ni sur les ulcères de jambe.			

Médicaments dermatologiques	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
-----------------------------	--	-----------	-----	---------	-------------------	----------------------------	---------------------------------	----	----

### Chimiothérapie à usage topique

#### Antiviraux


<b>Aciclovir</b>	ZOVIRAX®	oui	faible	5%	Crème (tb. 2 et 10 g)	Voie cutanée.	Ne pas utiliser en intrabuccal ou en intravaginal.		
------------------	----------	-----	--------	----	--------------------------	---------------	--	--	--

### Corticoïdes et préparations dermatologiques

#### Corticoïdes d'activité modérée

<b>Désonide</b>	TRIDESONIT®	non	important	0.05%	Crème (tb. 30 g)	Utiliser en massage.			
<b>Désonide</b>	LOCAPRED® LOCATOP®	non	important	0.10%	Crème (tb. 15, 30 g)	Utiliser en massage.			
<b>Hydrocortisone</b>	LOCOID®	non	important	0.10%	Crème épaisse (tb. 30 g)  Crème (tb. 30 g)	Voie cutanée. Appliquer en touches espacées puis étaler avec un gant en plastique jusqu'à ce que la crème soit entièrement absorbée.			
<b>Hydrocortisone</b>	LOCOID®	non	important	0.10%	Pommade (tb. 30 g)	Voie cutanée. Appliquer en touches espacées puis étaler avec un gant en plastique jusqu'à ce que la crème soit entièrement absorbée.			

Médicaments dermatologiques	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Hydrocortisone	LOCOID®	non	important	0.10%	Emulsion (fl. 30 ml)	Voie cutanée. Appliquer en touches espacées puis étaler avec un gant en plastique jusqu'à ce que la crème soit entièrement absorbée.			
Hydrocortisone	LOCOID®	non	important	0.10%	Lotion (fl. 30 ml)	Voie cutanée. Appliquer en touches espacées puis étaler avec un gant en plastique jusqu'à ce que la crème soit entièrement absorbée.			
<b>Corticoïdes d'activité forte</b>									
Bétaméthasone	DIPROSONE®	non	important	0.05%	Crème (tb. 30 g)	Utiliser en massage. Appliquer en touches espacées puis étaler jusqu'à ce que la crème soit entièrement absorbée.			
Bétaméthasone	DIPROSONE®	non	important	0.05%	Lotion (fl. 30 ml)	Utiliser en massage. Appliquer en touches espacées puis étaler jusqu'à ce que la crème soit entièrement absorbée.			
Bétaméthasone	DIPROSONE®	non	important	0.05%	Pommade (tb. 30 g)	Utiliser en massage. Appliquer en touches espacées puis étaler jusqu'à ce que la crème soit entièrement absorbée.			

 Médicaments dermatologiques	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
<b>Bétaméthasone</b>	BETNEVAL®	non	important	0.10%	Crème Pommade (tb. 10, 30, 100 g)	Voie cutanée. Appliquer en touches espacées puis étaler avec un gant en plastique jusqu'à ce que la crème soit entièrement absorbée.			
<b>Bétaméthasone</b>	BETNEVAL®	non	important	0.10%	Emulsion (fl. 15 g)	Voie cutanée. Appliquer en touches espacées puis étaler avec un gant en plastique jusqu'à ce que la crème soit entièrement absorbée.			
<b>Bétaméthasone + acide salicylique</b>	DIPROSALIC®	non	faible	0,5% + 2%	Lotion (fl. 30 g)	Voie cutanée. Appliquer en touches espacées puis étaler avec un gant en plastique jusqu'à ce que la crème soit entièrement absorbée.			
<b>Bétaméthasone + acide salicylique</b>	DIPROSALIC®	non	faible	0,05% + 3%	Pommade (tb. de 30 g)	Voie cutanée. Appliquer en touches espacées puis étaler avec un gant en plastique jusqu'à ce que la crème soit entièrement absorbée.			



Médicaments dermatologiques	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
-----------------------------	--	-----------	-----	---------	-------------------	----------------------------	---------------------------------	----	----

### Corticoïdes d'activité très forte

<b>Clobétasol</b>	DERMOVAL®	oui	important	0.05%	Crème (tb. 10 g)	Voie cutanée. Appliquer en touches espacées puis étaler avec un gant en plastique jusqu'à ce que la crème soit entièrement absorbée.			
<b>Clobétasol</b>	DERMOVAL®	non	important	0.05%	Gel (fl. 20 ml)	Le gel doit être appliqué en petites quantités directement sur le cuir chevelu, raie par raie. Se laver les mains après utilisation.			

### Antiseptiques et désinfectants

#### Produit iodé

<b>Povidone iodée</b>	BETADINE® Alcoolique	non	important	5%	Solution (fl. 125, 500 ml, unidoses 10 ml non remboursée)	A appliquer sur la surface de la peau avec une compresse stérile. Laisser sécher avant l'acte de petite chirurgie.		/!\	
<b>Povidone iodée</b>	BETADINE® Dermique	oui	important / faible	10%	Solution (unidoses 5 et 10 ml non remboursée et pas de générique, fl. 125 et 500 ml)	Voie cutanée. A utiliser pure (badigeonnage sur la peau) ou diluée (au 1/10 avec de l'eau ou du sérum physiologique stérile pour le lavage des plaies et à 2 % dans le sérum physiologique stérile pour les irrigations des plaies.		/!\	

Médicaments dermatologiques	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
<b>Povidone iodée</b>	BETADINE® Scrub	non	faible / important / modéré	4%	Solution (unidose 10 ml, fl. 125 ml)	A utiliser pure ou diluée. Rincer après application.		/!\	
<b>Biguanides et amidines</b>									
<b>Chlorhexidine + chlorure de benzalkonium + alcool benzylique</b>	BISEPTINE®	non	faible / important	250 mg/ 100 ml 25 mg/ 100 ml 4 ml/100 ml	Solution (fl. 100, 250 ml)	Usage cutané strict. Solution prête à l'emploi.	Eviter l'emploi successif avec les savons.	/!\	
<b>Autre</b>									
<b>Hypochlorite de sodium</b>	DAKIN®	non	modéré	0,5 g/100 ml (exprimé en chlore actif)	Solution (fl. 60, 125, 250, 500 ml)	Ne pas diluer. A appliquer en lavages, bains locaux, en irrigations, en compresses imbibées ou pansements humides.			

■ Système génito-urinaire et hormones sexuelles	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
---	--	-----------	-----	---------	-------------------	----------------------------	---------------------------------	----	----

### Anti-infectieux et antiseptiques à usage gynécologique

#### Dérivés imidazolés

<b>Econazole</b>	GYNO PEVARYL®	non	modéré	150 mg	Ovule	Rester allongée pendant l'administration.	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. Il est déconseillé d'utiliser un savon à pH acide (favorise la multiplication des candida).		
<b>Econazole</b>	GYNO PEVARYL®	oui	modéré	150 mg	Ovule à libération prolongée	Rester allongée pendant l'administration.	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. Il est déconseillé d'utiliser un savon à pH acide (favorise la multiplication des candida).		

■ Système génito-urinaire et hormones sexuelles	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Métronidazole	FLAGYL®	non	modéré	500 mg	Ovule	Rester allongée pendant l'administration.	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK.		
Autres									
Povidone iodée	BETADINE®	non	insuffisant	250 mg	Ovule			⚠	
Povidone iodée	BETADINE®	non	insuffisant	10%	Solution vaginale (fl. 125 et 500 ml)	A utiliser pure (badigeonnages internes ou externes) ou diluée avec un nécessaire à injections vaginales (2 cuillères à soupe par litre d'eau tiède).		⚠	
Hormones sexuelles et modulateurs de la fonction génitale									
Estrogènes									
Promestriène	COLPOTROPHINE®	non	modéré	1%	Crème vaginale (tb. 30g)	Application vulvaire en couche mince.			
Promestriène	COLPOTROPHINE®	non	modéré	10 mg	Capsule vaginale				

■ Système génito-urinaire et hormones sexuelles	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
<b>Anti-androgènes</b>									
<b>Cyprotérone</b>	ANDROCUR®	oui	important	50 mg 100 mg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. <i>Ecrasement possible des comprimés.</i>			/!\
<b>Médicaments urologiques</b>									
<b>Antispasmodiques urinaires</b>									
<b>Trospium</b>	CERIS®	non	modéré	20 mg	Cp. enrobé	A avaler avec un grand verre d'eau (goût très amer). Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer à jeun avant les repas.		/!\	/!\
<b>Médicaments utilisés dans l'hypertrophie bénigne de la prostate</b>									
<b>Alphabloquants</b>									
<b>Alfuzosine</b>	XATRAL®	oui	modéré	2,5 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer.		/!\	/!\
<b>Alfuzosine</b>	XATRAL®	oui	modéré	10 mg	Cp. à libération prolongée	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer après un repas.		/!\	/!\

■ Système génito-urinaire et hormones sexuelles	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Tamsulosine	MECIR®	oui	modéré	0,4 mg	Cp. pelliculé à libération prolongée	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer à heure fixe.		(!)	(!)
Tamsulosine	JOSIR® OMIX®	oui	modéré	0,4 mg	Gélule à libération prolongée (microgranules)	A avaler avec de l'eau. Ne pas ouvrir la gélule. Ne pas écraser, ne pas croquer les microgranules. A administrer à heure fixe, à la fin d'un repas. <i>Possibilité d'ouvrir les gélules mais ne pas écraser les microgranules. Mise en suspension des granules possible mais doit se faire juste avant l'administration. Il est possible de les administrer par une sonde nasogastrique selon le même procédé.</i>		(!)	(!)
Inhibiteurs de la 5-alpha testostérone réductase									
Dutastéride	AVODART®	non	modéré	0,5 mg	Capsule molle	A avaler avec de l'eau. Ne pas ouvrir la capsule. Ne pas écraser, ne pas croquer.		(!)	

■ Système génito-urinaire et hormones sexuelles	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Autres									
Serenoa repens	PERMIXON®	non	modéré	160 mg	Gélule	A avaler avec de l'eau. A administrer au cours d'un repas.			


Hormones systémiques, hormones sexuelles exclues	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
--	--	-----------	-----	---------	-------------------	----------------------------	---------------------------------	----	----

## Corticoïdes à usage systémique

### Glucocorticoïdes

<b>Bétaméthasone</b>	CELESTENE®	oui	important	2 mg	Cp. dispersible sécable	A avaler avec de l'eau ou après dissolution dans de l'eau. A administrer au cours d'un repas.	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. <i>Si impossibilité d'avalier, préférer la solution buvable (forme pédiatrique).</i>	⚠	⚠
<b>Bétaméthasone</b>	CELESTENE®	oui	important	0.05%	Sol. buvable en gouttes (fl. 30 ml)	A avaler après avoir mis les gouttes dans un verre d'eau. A administrer de préférence à la fin du repas.	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. Conservation : 8 semaines à t° ambiante après ouverture.	⚠	⚠



 Hormones systémiques, hormones sexuelles exclues	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
<b>Hydrocortisone</b>	HYDRO-CORTISONE®	non	important	10 mg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. <i>Possibilité d'écraser les comprimés et de les mélanger à un aliment.</i>	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK.	!Δ	!Δ
<b>Méthylprednisolone</b>	MEDROL®	non	important	4 mg 16 mg 100 mg	Cp. sécable  Comprimé	A avaler avec de l'eau. A administrer au cours du repas.	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK.	!Δ	!Δ
<b>Prednisone</b>	CORTANCYL®	oui	important	1 mg 5 mg 20 mg	Comprimé Cp. sécable Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. A administrer au cours d'un repas. <i>Ecrasement possible des comprimés. A administrer immédiatement après broyage car le principe actif est sensible à la lumière.</i>	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. Si impossibilité d'avaler, préférer le comprimé orodispersible (SOLUPRED®).	!Δ	!Δ
<b>Prednisolone</b>	SOLUPRED®	oui	important	5 mg 20 mg	Cp. orodispersible	Laisser fondre dans la bouche puis boire de l'eau. Ne pas croquer (risque d'amertume). A administrer au cours d'un repas.	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK.	!Δ	!Δ
<b>Prednisolone</b>	SOLUPRED®	oui	important	5 mg 20 mg	Cp. effervescent	Avaler après dissolution dans de l'eau. A administrer au cours d'un repas.	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. Tenir compte de la teneur en sodium.	!Δ	!Δ

Hormones systémiques, hormones sexuelles exclues	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
<b>Prednisolone</b>	SOLUPRED®	non	important	1 mg/ml	Sol. buvable (fl. 50 ml)	A administrer au cours d'un repas.	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. Tenir compte de la teneur en éthanol. Conservation : 1 mois à t° ambiante après ouverture.	⚠	⚠

## Médicaments de la thyroïde

### Hormones thyroïdiennes

<b>Lévothyroxine</b>	LEVOTHYROX®	oui	important	25 µg 50 µg 75 µg 100 µg 125 µg 150 µg 175 µg 200 µg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. A administrer à jeun. <i>Ecrasement possible des comprimés. A administrer immédiatement après broyage.</i>	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. <i>Si impossibilité d'avalier, préférer la solution buvable.</i>		
<b>Lévothyroxine</b>	L THYROXINE SERB®	non	important	0,15 mg/ml	Sol. buvable en gouttes (fl. 15 ml)	Utiliser le compte-goutte. A administrer à jeun.	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. Tenir compte de la teneur en éthanol. <i>Conservation : 1 mois après ouverture au réfrigérateur.</i>		

### Antithyroïdiens

<b>Carbimazole</b>	NEO-MERCAZOLE®	non	important	5 mg 20 mg	Comprimé	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer au cours d'un repas. <i>Ecrasement possible des comprimés. Peu soluble dans l'eau.</i>			⚠
--------------------	----------------	-----	-----------	---------------	----------	---	--	--	---

Hormones systémiques, hormones sexuelles exclues	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
---	--	-----------	-----	---------	-------------------	----------------------------	------------------------------------	----	----

### Hormones pancréatiques

### Hormones glycogénolytiques

<b>Glucagon</b>	GLUCAGEN®	non	important	1 mg/1 ml	Sol. injectable (poudre et solvant, kit : seringue préremplie)	A administrer par voie SC, IM ou IV.	Conservation : entre 2°C et 8°C ou à t° ambiante pendant 18 mois. Utiliser immédiatement après reconstitution.		
-----------------	-----------	-----	-----------	-----------	--	---	--	--	--

Anti-infectieux généraux à usage systémique	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
---	--	-----------	-----	---------	-------------------	----------------------------	---------------------------------	----	----

Antibactériens à usage systémique

Tétracyclines

<b>Doxycycline</b>	VIBRAMYCINE N®	oui	important / insuffisant	100 mg	Cp. sécable	<p>A avaler avec de l'eau ou après dissolution dans de l'eau en agitant bien après dispersion des comprimés (la couleur jaune est normale). Ne pas avaler en position couchée. Ne pas s'allonger pendant l'heure suivant la prise.</p> <p>A administrer au cours d'un repas et au moins 1 heure avant le coucher.</p> <p><i>Ne pas administrer en même temps qu'un produit lacté.</i></p>	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK.		
--------------------	-------------------	-----	-------------------------------	--------	-------------	---	--	--	--

Anti-infectieux généraux à usage systémique	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
---	--	-----------	-----	---------	-------------------	----------------------------	---------------------------------	----	----

## Bétalactamines

<b>Amoxicilline</b>	CLAMOXYL®	oui	important / insuffisant	500 mg	Gélule	A avaler avec de l'eau. Ne pas ouvrir la gélule. Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer au cours ou en dehors d'un repas. <i>Ne pas administrer en même temps qu'un produit lacté.</i>	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. Tenir compte de la teneur en sodium. <i>Si impossibilité d'avaler, préférer CLAMOXYL® poudre pour solution buvable.</i>	/!	
<b>Amoxicilline</b>	CLAMOXYL® (sans sucre)	oui	important / insuffisant	1 g	Cp. dispersible	A avaler avec de l'eau ou après dispersion dans de l'eau.	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. <i>Si impossibilité d'avaler préférer CLAMOXYL® poudre pour solution buvable.</i>	/!	
<b>Amoxicilline</b>	CLAMOXYL®	oui	important / insuffisant	125 mg/5 ml 250 mg/5 ml 500 mg/5 ml	Sol. buvable (poudre en fl. 60 ml)	Remplir le flacon avec de l'eau non gazeuse. A agiter avant emploi. Utiliser la cuillère-mesure.	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. Tenir en compte de la teneur en sodium. <i>Conservation : 14 jours à t° ambiante après reconstitution.</i>	/!	
<b>Amoxicilline + acide clavulanique</b>	AUGMENTIN®	oui	important / insuffisant	500 mg + 62,5 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. A administrer au début d'un repas.	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. Tenir compte de la teneur en potassium.	/!	/!

Anti-infectieux généraux à usage systémique	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
<b>Amoxicilline + acide clavulanique</b>	AUGMENTIN®	oui	important / insuffisant	1 g + 125 mg	Susp. buvable (poudre en sach.)	A avaler après dissolution dans de l'eau. A administrer au début d'un repas.	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. Tenir compte de la teneur en potassium. <i>Conservation : 7 jours entre 2 et 8°C après reconstitution.</i>	/!)	/!)
<b>Cloxacilline</b>	ORBENINE®	non	important / insuffisant	500 mg	Gélule	A avaler avec de l'eau. Ne pas ouvrir la gélule. Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer 30 minutes avant les repas.	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. Tenir compte de la teneur en sodium.	/!)	/!)
<b>Céphalosporines</b>									
<b>Céfixime</b>	OROKEN®	oui	important / insuffisant	200 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. <i>Ecrasement possible des comprimés.</i>	Si impossibilité d'avalier, préférer la solution buvable (forme pédiatrique).	/!)	
<b>Cefpodoxime</b>	ORELOX®	oui	important / insuffisant	100 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. A administrer au cours d'un repas ( <i>goût désagréable</i> ).	Si impossibilité d'avalier, préférer la solution buvable (forme pédiatrique).	/!)	
<b>Ceftriaxone</b>	ROCEPHINE®	oui	important	0,5 g/2 ml 1 g/3,5 ml	Sol. injectable (poudre et solvant)	A administrer par voie IM (injecter dans la face antérolatérale de la cuisse) ou administrer par voie SC. Ne pas injecter en IV.	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. Tenir compte de la teneur en sodium.	/!)	/!)

Anti-infectieux généraux à usage systémique	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Ceftriaxone	ROCEPHINE®	oui	important	0,5 g/5 ml 1 g/10 ml	Sol. injectable (poudre et solvant)	A administrer par voie IV (directe, lente, ou en perfusion) et SC (après dilution dans de l'eau pour préparation injectable ou sérum).	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. Tenir compte de la teneur en sodium.	/!\	/!\
Céfuroxime	ZINNAT®	oui	important / insuffisant	125 mg 250 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer.	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. Tenir compte de la teneur en sodium. <i>Si impossibilité d'avalier, préférer ZINNAT® 125 mg suspension buvable (forme pédiatrique).</i>	/!\	/!\
<b>Sulfamides et triméthoprim</b>									
Sulfaméthoxazole + triméthoprim	BACTRIM®	non	important	400 mg + 80 mg	Comprimé	A administrer au cours ou à la fin d'un repas.	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. <i>Si impossibilité d'avalier, préférer la suspension buvable (forme pédiatrique).</i>	/!\	/!\
Sulfaméthoxazole + triméthoprim	BACTRIM FORTE®	oui	important	800 mg + 160 mg	Comprimé	A administrer au cours ou à la fin d'un repas.	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. <i>Si impossibilité d'avalier, préférer la suspension buvable (forme pédiatrique).</i>	/!\	/!\

Anti-infectieux généraux à usage systémique	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
---	--	-----------	-----	---------	-------------------	----------------------------	---------------------------------	----	----

## Macrolides

<b>Azithromycine</b>	ZITHROMAX® ZITHROMAX® monodose	oui	important / insuffisant	250 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau.	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. <i>Si impossibilité d'avaler, préférer la suspension buvable (forme pédiatrique).</i>	!!	!!
<b>Azithromycine</b>	ORDIPHA®	non	important / insuffisant	500 mg	Cp. dispersible sécable	Disperser le comprimé ou le demi-comprimé dans un verre d'eau avant la prise.	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK.	!!	!!
<b>Azithromycine</b>	AZADOSE®	non	important / insuffisant	600 mg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. A administrer de préférence avant un repas.	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. <i>Si impossibilité d'avaler, préférer la suspension buvable (forme pédiatrique).</i>	!!	!!
<b>Clarithromycine</b>	ZECLAR®	oui	important / insuffisant	250 mg 500 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau.	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. <i>Si impossibilité d'avaler, préférer la suspension buvable (forme pédiatrique).</i>	!!	!!




Anti-infectieux généraux à usage systémique	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
<b>Clarithromycine</b>	MONOZECLAR® MONONAXY®	oui	important / insuffisant	500 mg	Cp. pelliculé à libération prolongée	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer au cours d'un repas.	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. <i>Si impossibilité d'avaler, préférer la suspension buvable (forme pédiatrique).</i>	(!)	(!)
<b>Roxithromycine</b>	RULID®	oui	important / insuffisant	100 mg 150 mg	Cp. pelliculé Cp. enrobé	A avaler avec de l'eau. A administrer avant un repas.	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. <i>Si impossibilité d'avaler, préférer les comprimés sécables pour suspension buvable (forme pédiatrique) ou les autres macrolides en solution buvable (ZECLAR®, ZITHROMAX®).</i>		
<b>Spiramycine</b>	ROVAMYCINE®	non oui	important / insuffisant	1,5 MUI 3 MUI	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer.	Si impossibilité d'avaler, préférer les autres macrolides en solution buvable (ZECLAR®, ZITHROMAX®).		
<b>Streptogramines</b>									
<b>Pristinamycine</b>	PYOSTACINE®	non	important	250 mg 500 mg	Cp. pelliculé Cp. pelliculé sécable	A avaler avec de l'eau. Possibilité d'écraser le comprimé et de le mélanger avec un aliment (lait, confiture). A administrer au cours d'un repas.	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK.		

Anti-infectieux généraux à usage systémique	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
<b>Fluoroquinolones</b>									
<b>Ciprofloxacin</b>	CIFLOX®	oui	important	250 mg 500 mg 750 mg	Cp. pelliculé sécable	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. Eviter la prise simultanée de lait et d'aliments riches en calcium. <i>Ecrasement possible des comprimés. Peut être administré chez les patients par sonde nasogastrique après broyage.</i>	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK.	/!	
<b>Ciprofloxacin</b>	UNIFLOX®	non	important	500 mg	Cp. pelliculé sécable	A avaler avec de l'eau. A administrer de préférence à jeun. Ne pas écraser, ne pas croquer. Ne doit pas être pris avec des produits laitiers ou des jus de fruits enrichis en minéraux.	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK.	/!	
<b>Ciprofloxacin</b>	CIFLOX®	non	important	500 mg/5 ml	Susp. buvable (Granulés et solvant)	Reconstituer à l'aide du solvant. Ne pas diluer dans de l'eau. Agiter avant emploi. Eviter la prise simultanée de lait et d'aliments riches en calcium.	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. Conservation : 14 jours entre 2°C - 8°C ou à t° ambiante après reconstitution.	/!	

Anti-infectieux généraux à usage systémique	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Lévo <span style="color: blue;">floxacin</span> e	TAVANIC®	oui	important	500 mg	Cp. pelliculé sécable	A avaler avec de l'eau. <i>Ecrasement possible des comprimés. A administrer immédiatement car principe actif sensible à la lumière.</i>	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK.	(!)	
Nor <span style="color: blue;">floxacin</span> e	NOROXINE®	oui	important	400 mg	Cp. enrobé	A avaler avec de l'eau. Eviter la prise simultanée de produits laitiers.	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK <i>Si impossibilité d'avaler, préférer la solution buvable CIFLOX®.</i>	(!)	
Of <span style="color: blue;">floxacin</span> e	OFLOCET®	oui	important / insuffisant	200 mg	Cp. pelliculé sécable	A avaler avec de l'eau. <i>Possibilité d'écraser les comprimés et de les dissoudre dans du jus de pomme. A administrer immédiatement car principe actif sensible à la lumière et à l'humidité.</i>	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK.	(!)	
Of <span style="color: blue;">floxacin</span> e	MONOFLOCET®	non	important	200 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau.	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. Tenir compte de la teneur en sodium. Si impossibilité d'avaler, préférer la suspension buvable (forme pédiatrique).	(!)	

Anti-infectieux généraux à usage systémique	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Autres									
Acide fusidique	FUCIDINE®	non	important	250 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. A administrer au cours d'un repas. <i>Ecrasement possible des comprimés mais principe actif amer, il faut donc le mélanger avec un liquide sucré. A administrer immédiatement après broyage. Ne pas mélanger à du lait.</i>	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. Tenir compte de la teneur en sodium. <i>Si impossibilité d'avalier, préférer la suspension buvable (forme pédiatrique).</i>		⚠
Métronidazole	FLAGYL®	non	important	250 mg 500 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau.	Risque d'effet antabuse. Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. <i>Si impossibilité d'avalier, préférer la suspension buvable.</i>		⚠

 Anti-infectieux généraux à usage systémique	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
<b>Métronidazole</b>	FLAGYL®	non	important	4%	Susp. buvable (fl. 120 ml)	A administrer par voie orale.	Risque d'effet antabuse. Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. Tenir compte de la teneur en éthanol. <i>Conservation : 2 mois à t° ambiante après ouverture.</i>		⚠
<b>Nitrofurantoïne<sup>BLP</sup></b>	FURADOINE®	non	important	50 mg	Comprimé	A administrer au cours d'un repas.	<b>Inapproprié selon la liste de Beers, de Laroche et Priscus : rapport bénéfice/risque défavorable et efficacité discutable.</b> <b>Risque d'IR, d'atteinte hépatique, de pneumopathie, de neuropathie périphérique, de réaction allergique.</b> <b>Alternatives:</b> - thérapeutique : antibiotique à élimination rénale et adapté à l'antibiogramme. - non thérapeutique : augmenter les apports hydriques. Surveillance des fonctions rénale, hépatique et pulmonaire.	⚠	⚠

Anti-infectieux généraux à usage systémique	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Nitrofurantoïne <sup>B L P</sup>	FURADANTINE®	non	important	50 mg	Gélule	A administrer au cours d'un repas. <i>Ouverture possible des gélules.</i> <i>A administrer immédiatement après ouverture.</i>	Inapproprié selon la liste de Beers, de Laroche et Priscus : rapport bénéfique/risque défavorable et efficacité discutable. Risque d'IR, d'atteinte hépatique, de pneumopathie, de neuropathie périphérique, de réaction allergique. Alternatives: - thérapeutique : antibiotique à élimination rénale et adapté à l'antibiogramme. - non thérapeutique : augmenter les apports hydriques. Surveillance des fonctions rénale, hépatique et pulmonaire.	⚠	⚠
Antimycosiques à usage systémique									
Amphotéricine B	FUNGIZONE®	non	important	10%	Susp. buvable (fl. 40 ml)	A administrer par voie orale.	Tenir compte de la teneur en éthanol et en potassium. <i>Conservation : 10 jours à t° ambiante avec ouverture quotidienne.</i>	⚠	⚠
Fluconazole	TRIFLUCAN®	oui	important	50 mg 100 mg 200 mg	Gélule	A avaler avec de l'eau. <i>Ouverture possible des gélules.</i>	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. <i>Si impossibilité d'avalier préférer la forme buvable.</i>	⚠	⚠

Anti-infectieux généraux à usage systémique	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
<b>Fluconazole</b>	TRIFLUCAN®	oui non	important	50 mg/5 ml 200 mg/5 ml	Susp. buvable (poudre en fl. 24,4 g)	Reconstituer avec de l'eau. Agiter avant emploi. Utiliser la cuillère mesure.	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. <i>Conservation : 2 semaines à t° ambiante après ouverture.</i>	/!\	/!\
<b>Antiviraux à usage systémique</b>									
<b>Aciclovir</b>	ZOVIRAX®	oui	important	200 mg 800 mg	Comprimé	A avaler avec de l'eau.	Si impossibilité d'avalier, préférer la suspension buvable.	/!\	/!\
<b>Aciclovir</b>	ZOVIRAX®	oui	important	200 mg/5 ml 800 mg/10 ml	Susp. buvable (fl. 125 et 180 ml)	Utiliser le gobelet doseur pour prélever.	Conservation : 2 mois à t° ambiante après ouverture.	/!\	/!\
<b>Oseltamivir</b>	TAMIFLU®	non	insuffisant / faible	30 mg 45 mg 75 mg	Gélule	A avaler avec de l'eau. Ouverture possible de la gélule, mélanger le contenu avec au maximum une cuillère à café d'un aliment sucré approprié (principe actif à goût amer). La préparation doit être mélangée et administrée immédiatement au patient dans sa totalité.		/!\	

■ Anti-infectieux généraux à usage systémique	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
<b>Oseltamivir</b>	TAMIFLU®	non	insuffisant / faible	12 mg/ml	Poudre orale (fl. 30 g)	Utiliser la seringue pour l'administration.	Conservation : 10 jours entre 2 et 8°C après ouverture.	(!)	
<b>Valaciclovir</b>	ZELITREX®	oui	important	500 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau.	<i>Si impossibilité d'avaler, préférer ZOVIRAX® en solution buvable .</i>	(!)	



Antinéoplasiques et immunomodulateurs	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
---------------------------------------	--	-----------	-----	---------	-------------------	----------------------------	---------------------------------	----	----

## Thérapeutiques endocrines

### Hormones et apparentés

#### Analogues de l'hormone entraînant la libération de gonadotrophines

<b>Leuproréline</b>	ENANTONE®	non	important	3,75 mg 11,25 mg 30 mg	Susp. injectable à libération prolongée (poudre et solvant)	A administrer par voie SC ou IM. Ne pas injecter en IV, en intra-artériel. Dosage 30 mg réservé à la voie SC.			
---------------------	-----------	-----	-----------	------------------------------	---	---	--	--	--

### Antihormones et apparentés

#### Anti-estrogènes

<b>Tamoxifène</b>	NOLVADEX®	oui	important	10 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. <i>Possibilité d'écraser les comprimés. A administrer immédiatement après broyage (principe actif sensible à la lumière).</i>	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. <i>Protection nécessaire pour les cytotoxiques, manipulation interdite chez la femme enceinte en cas de broyage.</i>		
-------------------	-----------	-----	-----------	-------	---------------	--	--	--	--

Antinéoplasiques et immunomodulateurs	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
<b>Tamoxifène</b>	NOLVADEX®	oui	important	20 mg	Cp. enrobé	A avaler avec de l'eau.			
<b>Antiandrogènes</b>									
<b>Bicalutamide</b>	CASODEX®	oui	important	50 mg	Cp. enrobé	A avaler avec de l'eau. A administrer à heure fixe.			/!\
<b>Inhibiteurs enzymatiques</b>									
<b>Anastrozole</b>	ARIMIDEX®	oui	important	1 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. A administrer à heure fixe.		/!\	/!\
<b>Létrozole</b>	FEMARA®	oui	important	2,5 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau.		/!\	/!\

Muscle et squelette	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
---------------------	--	-----------	-----	---------	-------------------	----------------------------	---------------------------------	----	----

## Topiques pour douleurs articulaire et musculaire

### Anti-inflammatoires non stéroïdiens à usage topique

Diclofénac	VOLTARENE® Emulgel	oui	Modéré / Faible	1%	Gel (fl. 100 ml, tb. 50 g)	En massage doux et prolongé sur la région douloureuse ou inflammatoire. Se laver les mains après utilisation.			
Diclofénac	FLECTOR®	oui	Modéré / Faible	1%	Gel (fl. 100 g, tb. 60 g)	En massage doux et prolongé sur la région douloureuse ou inflammatoire. Se laver les mains après utilisation			

■ Muscle et squelette	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Anti-inflammatoires et anti-rhumatismaux									
Anti-inflammatoires et anti-rhumatismaux non stéroïdiens									
Diclofénac <sup>B</sup>	VOLTARENE®	oui	important	25 mg 50 mg	Cp. gastro-résistant	A avaler avec de l'eau. Ne pas croquer, ne pas écraser, ne pas sucer. A administrer au cours d'un repas.	<p>Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK.</p> <p>Inapproprié selon la liste de Beers 2012. Risque d'hémorragies gastro-intestinales et d'ulcères chez les patients à haut risque tel que les sujets âgés de plus de 75 ans et/ou en cas d'association avec des corticoïdes, des anticoagulants ou des anti-agrégants plaquettaires. Il est conseillé de prendre un IPP ou du misoprostol mais ce risque n'est pas diminué. La prise chronique est à éviter à moins que les autres alternatives ne soient pas efficaces.</p>	⚠	⚠

■ Muscle et squelette	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Diclofénac <sup>B</sup>	VOLTARENE®	non	important	75 mg 100 mg	Cp. enrobé à libération prolongée	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer, ne pas sucer. A administrer au cours d'un repas.	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. <b>Inapproprié selon la liste de Beers 2012. Risque d'hémorragies gastro-intestinales et d'ulcères chez les patients à haut risque tel que les sujets âgés de plus de 75 ans et/ou en cas d'association avec des corticoïdes, des anticoagulants ou des anti-agrégants plaquettaires. Il est conseillé de prendre un IPP ou du misoprostol mais ce risque n'est pas diminué. La prise chronique est à éviter à moins que les autres alternatives ne soient pas efficaces.</b>	/!	/!

■ Muscle et squelette	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Diclofénac <sup>B</sup>	VOLTARENE®	oui	important	100 mg	Suppositoire	A administrer par voie rectale	<p>Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK.  <b>Inapproprié selon la liste de Beers 2012. Risque d'hémorragies gastro-intestinales et d'ulcères chez les patients à haut risque tel que les sujets âgés de plus de 75 ans et/ou en cas d'association avec des corticoïdes, des anticoagulants ou des anti-agrégants plaquettaires. Il est conseillé de prendre un IPP ou du misoprostol mais ce risque n'est pas diminué. La prise chronique est à éviter à moins que les autres alternatives ne soient pas efficaces.</b></p>	⚠	⚠

■ Muscle et squelette	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
	Ibuprofène <sup>B</sup>  ADVIL®	oui	important	100 mg 200 mg 400 mg	Cp. enrobé	A avaler avec de l'eau. Ne pas croquer, ne pas écraser, ne pas sucer. A administrer au cours d'un repas.	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. <b>Inapproprié selon la liste de Beers 2012. Risque d'hémorragies gastro-intestinales et d'ulcères chez les patients à haut risque tel que les sujets âgés de plus de 75 ans et/ou en cas d'association avec des corticoïdes, des anticoagulants ou des anti-agrégants plaquettaires. Il est conseillé de prendre un IPP ou du misoprostol mais ce risque n'est pas diminué. La prise chronique est à éviter à moins que les autres alternatives ne soient pas efficaces.</b>	/!\	/!\
Antigoutteux									
Inhibiteurs de la synthèse de l'acide urique									
	Allopurinol  ZYLORIC®	oui	important	100 mg 200 mg 300 mg	Comprimé	A avaler avec de l'eau. A administrer après les repas. <i>Écrasement possible des comprimés. Broyer peu de temps avant administration, ne pas conserver plus de 24h.</i>	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK.	/!\	

Muscle et squelette	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
---------------------	--	-----------	-----	---------	-------------------	----------------------------	---------------------------------	----	----

Médicaments sans effet sur le métabolisme de l'acide urique

Colchicine + tiémonium <sup>L</sup> + opium	COLCHIMAX®	non	important	1 mg + 50 mg + 12,5 mg	Cp. pelliculé sécable	A avaler avec de l'eau. A administrer au cours d'un repas. <i>Ecrasement possible des comprimés.</i>	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. <b>Le tiémonium, destiné à limiter l'apparition de phénomènes diarrhéiques provoqués par la colchicine, est un antispasmodique inapproprié selon la liste de Laroche. Il n' aurait pas d'efficacité clairement démontrée, et présente des effets indésirables anticholinergiques.</b>	⚠	⚠
---	------------	-----	-----------	------------------------------------	--------------------------	---	---	---	---

Médicaments pour le traitement des désordres osseux

Médicaments agissant sur la structure osseuse et sur la minéralisation

Biphosphonates

Acide alendronique	FOSAMAX®	oui	important	10 mg 70 mg	Comprimé	A avaler avec de l'eau. Ne pas croquer, ne pas laisser fondre dans la bouche, ne pas sucrer. A avaler en position assise ou debout. Ne pas s'allonger dans les 30 minutes après administration. A administrer 30 minutes avant un repas.		⚠	
-----------------------	----------	-----	-----------	----------------	----------	---	--	---	--



■ Muscle et squelette	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Acide clodronique	CLASTOBAN®	non	important	800 mg	Cp. pelliculé sécable	<p>A avaler avec de l'eau. Ne pas croquer, ne pas laisser fondre dans la bouche, ne pas sucer. A avaler en position assise ou debout. Ne pas s'allonger dans les 30 minutes après administration. A administrer 30 minutes avant un repas. <i>Possibilité de laisser fondre dans un verre d'eau plutôt que d'écraser les comprimés.</i></p>		⚠	
Acide risédronique	ACTONEL®	oui non oui oui	important	5 mg 30 mg 35 mg 75 mg	Cp. pelliculé	<p>A avaler avec de l'eau. Ne pas croquer, ne pas laisser fondre dans la bouche, ne pas sucer. A avaler en position assise ou debout. Ne pas s'allonger dans les 30 minutes après administration. A administrer 30 minutes avant un repas. <i>Ecrasement possible des comprimés exclusivement lors de l'administration par sonde.</i></p>		⚠	

■ Muscle et squelette	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Biphosphonates en association									
Acide alendronique + colécalciférol	FOSAVANCE®	oui	important	70mg + 70µg  et  70mg + 140µg	Comprimé	<p>A avaler avec de l'eau. Ne pas croquer, ne pas laisser fondre dans la bouche, ne pas sucer. A avaler en position assise ou debout. Ne pas s'allonger dans les 30 minutes après administration. Eviter la prise simultanée de lait et d'aliments riches en calcium. A administrer 30 minutes avant un repas.</p>		⚠	

■ Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
-------------------	--	-----------	-----	---------	-------------------	----------------------------	---------------------------------	----	----

## Anesthésiques

### Anesthésiques locaux

#### Amides

Lidocaïne	XYLOCAINE®	non	important	2%	Gel urétral (seringue 10 g)	Usage urétral strict. Ne pas injecter. Introduire doucement l'extrémité de la seringue dans le méat jusqu'à étanchéité après avoir suivi les instructions concernant la manipulation de la seringue.			
-----------	------------	-----	-----------	----	--------------------------------	---	--	--	--

Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Lidocaïne	XYLOCAINE® visqueuse	non	important	2%	Gel oral (tb. 100 g)	<p>Dans l'indication "douleurs œso-gastriques" : Absorber tel quel, puis avaler de suite un verre d'eau.</p> <p>Dans "l'indication explorations instrumentales" : Répartir le produit avec la langue.</p>			(!)
Lidocaïne + prilocaine	EMLA®	oui	important	5%	Crème (tb. 5 g, 30 g)	<p>A appliquer au moins 1 h avant l'intervention sur la peau puis recouvrir d'un pansement.</p> <p>Si application sur muqueuse: pansement non nécessaire.</p> <p>Ne pas appliquer sur l'oeil ou à proximité des yeux.</p> <p>Ne pas appliquer dans le conduit auditif externe si le tympan est lésé.</p>			
Lidocaïne + prilocaine	EMLAPATCH®	non	important	5%	Pansement adhésif cutané	<p>A appliquer au moins 1 h avant l'intervention.</p> <p>Retirer le résidu avec une compresse à la fin de la durée d'application.</p> <p>Ne pas appliquer sur l'oeil ou à proximité des yeux.</p> <p>Ne pas appliquer dans le conduit auditif externe si le tympan est lésé.</p>			

Systeme nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
-----------------	--	-----------	-----	---------	-------------------	----------------------------	---------------------------------	----	----

## Analgésiques

### Opioides

#### Alcaloïdes naturels de l'opium

<b>Morphine chlorhydrate</b>	MORPHINE (Chlorhydrate) AGUETTANT®	oui	important	10 mg/ml	Sol. injectable (amp. 1, 5, 10 ml)	A administrer en IV, SC, intra-rachidien, péridural, intraventriculaire. Ne pas administrer en IM.		!/\	!/\
<b>Morphine chlorhydrate</b>	MORPHINE (Chlorhydrate) AGUETTANT®	oui	important	20 mg/ml	Sol. injectable (amp. 1, 10 ml)	A administrer en IV, SC, intra-rachidien, péridural, intraventriculaire. Ne pas administrer en IM.		!/\	!/\
<b>Morphine chlorhydrate</b>	MORPHINE (Chlorhydrate) AGUETTANT®	oui	important	40 mg/ml	Sol. injectable (amp. 10 ml)	A administrer en IV, SC, intra-rachidien, péridural, intraventriculaire. Ne pas administrer en IM.		!/\	!/\
<b>Morphine sulfate</b>	ACTISKENAN®	non	important	5 mg 10 mg 20 mg 30 mg	Gélule à libération immédiate	A avaler avec de l'eau. Ouverture possible de la gélule. Mélanger avec un aliment ou administrer avec une sonde gastrique. <i>Ne pas écraser les granules.</i>		!/\	!/\

	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
<b>Morphine sulfate</b>	SEVREDOL®	non	important	10 mg 20 mg	Cp. pelliculé sécable à libération immédiate	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer.		⚠	⚠
<b>Morphine sulfate</b>	ORAMORPH®	non	important	10 mg/5ml 20 mg/5ml 30 mg/5ml 100mg/5ml	Sol. buvable à libération immédiate (unidose 5 ml)	Utiliser pur ou mélangé avec un aliment. Administration possible par sonde gastrique ou nasogastrique.	Conservation : 2 mois après ouverture.	⚠	⚠
<b>Morphine sulfate</b>	SKENAN LP®	non	important	10 mg 30 mg 60 mg 100 mg 200 mg	Gélule à libération prolongée (microgranules)	A avaler avec de l'eau. Ouverture possible de la gélule. Ne pas écraser, ne pas croquer les microgranules. Mélanger le contenu avec les aliments. Possibilité d'administrer les microgranules par sonde nasogastrique.		⚠	⚠
<b>Morphine sulfate</b>	MOSCONTIN LP®	non	important	10 mg 30 mg 60 mg 100 mg 200 mg	Cp. pelliculé à libération prolongée	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer.		⚠	⚠
<b>Codéine + paracétamol</b>	CODOLIPRANE®	oui	important	400 mg + 20 mg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer.	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK.	⚠	⚠

■ Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
<b>Codéine + paracétamol</b>	DAFALGAN CODEINE®	non	important	500 mg + 30 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer.	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK.	⚠	⚠
<b>Codéine + paracétamol</b>	DAFALGAN CODEINE®	oui	important	500 + 30 mg	Cp. effervescent sécable	A dissoudre dans un peu de liquide avant administration.	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. Tenir compte de la teneur en sodium.	⚠	⚠
<b>Autres opioïdes</b>									
<b>Tramadol + paracétamol</b>	IXPRIM® ZALDIAR®	oui	important	37,5 mg + 325 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer.	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK.	⚠	⚠
<b>Tramadol + paracétamol</b>	IXPRIM® ZALDIAR®	oui	important	37,5 mg + 325 mg	Cp. effervescent	A avaler après dissolution complète dans de l'eau.	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. Tenir compte de l'apport en sodium.	⚠	⚠
<b>Dérivés de la diphenylpipéridine</b>									
<b>Fentanyl</b>	DUROGESIC®	oui	important	12 µg/h 25 µg/h 50 µg/h 75 µg/h 100 µg/h	Dispositif transdermique	Appliquer sur une peau non irritée, non écorchée, propre et sèche. Changer de site à chaque application : le tronc, les bras, le haut du dos. Ne pas découper le dispositif.		⚠	⚠

■ Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
-------------------	--	-----------	-----	---------	-------------------	----------------------------	---------------------------------	----	----

## Autres analgésiques et antipyrétiques

### Anilides

<b>Paracétamol</b>	DOLIPRANE®	non	important	500 mg 1 g	Comprimé	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer.	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK.	/!\	/!\
<b>Paracétamol</b>	DAFALGAN®	non	important	500 mg	Gélule	A avaler de l'eau. Ne pas ouvrir la gélule. Ne pas écraser, ne pas croquer.	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK.	/!\	/!\
<b>Paracétamol</b>	EFFERALGAN®	non	important	500 mg 1 g	Cp. effervescent sécable	Dissoudre dans de l'eau. Boire après dissolution complète.	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. Tenir compte de l'apport en sodium.	/!\	/!\

### Autres

<b>Néfopam</b>	ACUPAN®	oui	important	20 mg/2 ml	Sol. injectable (amp. 2 ml)	A administrer en IM profonde ou en IV lente sur plus de 15 minutes, le patient étant allongé.		/!\	/!\
----------------	---------	-----	-----------	------------	--------------------------------	--	--	-----	-----



■ Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
-------------------	--	-----------	-----	---------	-------------------	----------------------------	---------------------------------	----	----

## Antiépileptiques

### Dérivés de la carboxamide

Carbamazépine <sup>B</sup>	TEGRETOL®	oui	important	200 mg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer.	<p>Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK.</p> <p>Inapproprié selon la liste de Beers 2012. Surveiller les taux plasmatiques.</p> <p>Précaution d'emploi : peut exacerber ou causer un syndrome inapproprié d'hormone antidiurétique ou d'hyponatrémie.</p> <p>Surveillance étroite de la natrémie à l'initiation du traitement ou en cas de changement de dose.</p>		
----------------------------	-----------	-----	-----------	--------	-------------	--	---	--	--

Systeme nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Carbamazépine <sup>B</sup>	TEGRETOL®	oui	important	200 mg 400 mg	Cp. pelliculé sécable à libération prolongée	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer.	<p>Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK.</p> <p>Inapproprié selon la liste de Beers 2012. Surveiller les taux plasmatiques.</p> <p>Précaution d'emploi : peut exacerber ou causer un syndrome inapproprié d'hormone antidiurétique ou d'hyponatrémie.</p> <p>Surveillance étroite de la natrémie à l'initiation du traitement ou en cas de changement de dose.</p>		
Carbamazépine <sup>B</sup>	TEGRETOL®	non	important	20 mg/ml	Susp. buvable (fl. 150 ml)	A avaler avec un peu d'eau. Utiliser la seringue graduée en millilitres pour prélever la dose correcte.	<p>Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK.</p> <p>Inapproprié selon la liste de Beers 2012. Surveiller les taux plasmatiques.</p> <p>Précaution d'emploi : peut exacerber ou causer un syndrome inapproprié d'hormone antidiurétique ou d'hyponatrémie.</p> <p>Surveillance étroite de la natrémie à l'initiation du traitement ou en cas de changement de dose.</p>		

■ Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
-------------------	--	-----------	-----	---------	-------------------	----------------------------	---------------------------------	----	----

## Dérivés d'acide gras

<b>Acide valproïque</b>	DEPAKINE®	oui	important	200 mg 500 mg	Cp. gastro-résistant	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer de préférence au cours des repas.		⚠	
<b>Acide valproïque</b>	DEPAKINE® Chrono	oui	important	500 mg	Cp. pelliculé sécable à libération prolongée	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer de préférence au cours des repas.		⚠	
<b>Acide valproïque</b>	DEPAKINE®	oui	important	200 mg/ml	Sol. buvable (fl. 40 ml)	Utiliser uniquement avec la seringue présente dans la boîte pour prélever . La solution sera absorbée après dilution dans un peu de boisson. A administrer de préférence au cours des repas.	Conservation : 1 mois après ouverture.	⚠	
<b>Acide valproïque</b>	DEPAKINE®	non	important	57,64 mg/ml	Sirop (fl. 150 ml)	Prélever uniquement à l'aide de la seringue présente dans la boîte. A administrer de préférence au cours des repas.	Tenir compte de la teneur en sodium. Conservation : 1 mois après ouverture.	⚠	
<b>Acide valproïque</b>	DEPAKOTE®	non	important	250 mg 500 mg	Cp. gastro-résistant	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer de préférence au cours des repas.		⚠	

Systeme nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
<b>Valpromide</b>	DEPAMIDE®	non	important	300 mg	Cp. pelliculé gastro-résistant	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer de préférence au cours des repas.		/!\	
<b>Autres antiépileptiques</b>									
<b>Gabapentine</b>	NEURONTIN®	oui	important	100 mg 300 mg 400 mg	Gélule	A avaler avec de l'eau. Ne pas ouvrir la gélule. Ne pas écraser, ne pas croquer.		/!\	
<b>Gabapentine</b>	NEURONTIN®	oui	important	600 mg 800 mg	Cp. pelliculé sécable	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer.		/!\	
<b>Lamotrigine</b>	LAMICTAL®	oui	important	2 mg 5 mg 25 mg 50 mg 100 mg 200 mg	Cp. dispersible ou à croquer	A avaler avec de l'eau. Dissoudre dans de l'eau ou mâcher le comprimé. <i>A administrer toujours à la même heure, pendant le repas.</i>		/!\	/!\

Système nerveux		Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
<b>Prégabaline</b>		LYRICA®	non	important	25 mg 50 mg 75 mg 100 mg 150 mg 200 mg 300 mg	Gélule	A avaler avec de l'eau. Ne pas ouvrir la gélule. Ne pas écraser, ne pas croquer. <i>Overture possible de la gélule.</i>		/\	

## Antiparkinsoniens


### Dopaminergiques

#### Dopa et dérivés

<b>Lévodopa + bensérazide</b>		MODOPAR®	oui	important	200 mg + 50 mg  50 mg + 12,5 mg  100 mg + 25 mg	Gélule	A avaler avec de l'eau. Ne pas ouvrir ni croquer la gélule. A administrer au moins 30 minutes avant le repas.			
<b>Lévodopa + bensérazide</b>		MODOPAR®	non	important	100 mg + 25 mg	Gélule à libération prolongée	A avaler avec de l'eau. Ne pas ouvrir ni croquer la gélule. A administrer au moins 30 minutes avant le repas.			

 Système nerveux

Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
<p><b>Lévodopa + bensérazide</b></p>	<p>MODOPAR®</p>	<p>non</p>	<p>important</p>	<p>100 mg + 25 mg</p>	<p>Cp. sécable pour susp. buvable</p>	<p>Dissoudre dans de l'eau afin d'obtenir une suspension laiteuse. Remuer avant d'administrer dans la demi-heure. A administrer au moins 30 minutes avant le repas.</p>			
<p><b>Lévodopa + carbidopa</b></p>	<p>SINEMET®</p>	<p>oui</p>	<p>important</p>	<p>100 mg + 10 mg  250 mg + 5 mg</p>	<p>Cp. sécable</p>	<p>A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer au début des repas.</p>			
<p><b>Lévodopa + carbidopa</b></p>	<p>SINEMET®</p>	<p>oui</p>	<p>important</p>	<p>100 mg + 25 mg  200 mg + 50 mg</p>	<p>Cp. à libération prolongée</p>	<p>A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer au début des repas.</p>			

 Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
<p style="text-align: center;"> <b>Lévodopa</b>            +  <b>carbidopa</b>            +  <b>entacapone</b> </p>	<p style="text-align: center;">STALEVO®</p>	<p style="text-align: center;">non</p>	<p style="text-align: center;">important</p>	<p style="text-align: center;">           50+12,5+200 mg            75+18,75+200 mg            100+25+200 mg            125+31,25+200 mg            150+37,5+200 mg            200+50+200 mg         </p>	<p style="text-align: center;">Cp. pelliculé</p>	<p>           A avaler avec de l'eau.            Ne pas fractionner le comprimé.  <i>Ecrasement possible des comprimés. Risque de perdre de la poudre. Administration immédiate sur un aliment semi-solide (ne pas dissoudre au préalable).</i> </p>		<p style="text-align: center;">!/\</p>	<p style="text-align: center;">!/\</p>

■ Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Agonistes dopaminergiques									
Piribédil <sup>L</sup>	TRIVASTAL®	non	insuffisant	20 mg	Cp. enrobé	A avaler avec de l'eau. Ne pas croquer. A administrer en fin de repas. <i>Ecrasement possible des comprimés.</i>	Inapproprié selon la liste de Laroche : pas d'efficacité clairement démontrée, risque d'hypotension orthostatique et de chutes chez les sujets âgés. alternative thérapeutique : abstention thérapeutique.		
Piribédil <sup>L</sup>	TRIVASTAL®	non	insuffisant	50 mg	Cp. enrobé à libération prolongée	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer en fin de repas.	Inapproprié selon la liste de Laroche : pas d'efficacité clairement démontrée, risque d'hypotension orthostatique et de chutes chez les sujets âgés. alternative thérapeutique : abstention thérapeutique.		



☐ Système nerveux

Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH	
<b>Piribédil<sup>L</sup></b>	TRIVASTAL®	non	insuffisant	3 mg/ml	Sol. injectable (amp. 1 ml)	A administrer par voie IM ou IV lente.	Inapproprié selon la liste de Laroche : pas d'efficacité clairement démontrée, risque d'hypotension orthostatique et de chutes chez les sujets âgés. alternative thérapeutique : abstention thérapeutique.		
<b>Pramipéxole</b>	SIFROL®	non	important	0,18 mg 0,7 mg	Comprimé	A avaler avec de l'eau.		⚠	
<b>Pramipéxole</b>	SIFROL®	non	important	0,26 mg 0,52 mg 1,05 mg 2,1 mg	Cp. à libération prolongée	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer à heure fixe.		⚠	

■ Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Ropinirole	REQUIP®	oui	important	0,25 mg 0,5 mg 1 mg 2,5 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. A administrer au cours des repas. <i>Ecrasement possible des comprimés. Administration immédiate.</i>		/!\	/!\
Ropinirole	REQUIP®	oui	important	2 mg 4 mg 8 mg	Cp. pelliculé à libération prolongée	A avaler avec de l'eau. A administrer à heure fixe au cours d'un repas.		/!\	/!\
<b>Autres dopaminergiques</b>									
Entacapone	COMTAN®	non	important	200 mg	Cp. pelliculé	A prendre avec ou sans aliments.		/!\	/!\


Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
-----------------	--	-----------	-----	---------	-------------------	----------------------------	---------------------------------	----	----


Psycholeptiques


Antipsychotiques

Diazépines, oxazépines, thiazépines et oxépines

Clozapine <sup>B P</sup>	LEPONEX®	oui	important	25 mg 100 mg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. <i>Ecrasement possible des comprimés et administrer de préférence dans l'alimentation.</i>	<p>Surveillance stricte de la formule sanguine. Compléter le carnet de suivi prévu pour le traitement. <b>Inapproprié selon la liste de Beers 2012 et Priscus : risque élevé d'agranulocytose et de myocardite. Effets anticholinergiques et légers effets extrapyramidaux, parkinsonisme, hypotonie, sédation, risque de chute, augmentation de la mortalité chez les patients déments.</b> <b>Alternative thérapeutique : neuroleptique atypique avec une balance bénéfique/risque favorable (ex : rispéridone).</b> Surveillance des effets indésirables anticholinergiques ou extrapyramidaux, des fonctions neurologique et cognitive, cardiovasculaire et en cas d'antécédent de chute. Mesure de la tension artérielle.</p>	⚠	⚠
--------------------------	----------	-----	-----------	-----------------	-------------	---	--	---	---

 Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Loxapine <sup>B</sup>	LOXAPAC®	non	important	25 mg 50 mg 100 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer.	Inappropriée selon la liste de Beers 2012. Risque augmenté d'accident vasculaire cérébral et de mortalité chez les déments.	(!)	(!)
Loxapine <sup>B</sup>	LOXAPAC®	non	important	25 mg/goutte	Sol. buvable (fl. 30, 60 ml)	Utiliser la seringue pour l'administration.	Conservation : 4 semaines après ouverture Inapproprié selon la liste de Beers 2012. Risque augmenté d'accident vasculaire cérébral et de mortalité chez les déments.	(!)	(!)

 Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Olanzapine <sup>B P</sup>	ZYPREXA®	oui	important	5 mg 7,5 mg 10 mg	Cp. enrobé	A avaler avec de l'eau. Administrer à heure fixe. Ne pas écraser, ne pas croquer.	<p>Inapproprié selon la liste de Beers 2012 et Priscus. Effets anticholinergiques et légers effets extrapyramidaux, parkinsonisme, hypotonie, sédation, risque de chute, augmentation de la mortalité chez les patients déments. Alternative thérapeutique : neuroleptique atypique avec une balance bénéfice/risque favorable (ex : risperdone). Surveillance clinique des effets indésirables notamment anticholinergiques ou extrapyramidaux, antécédent de chute, surveillance des fonctions neurologique et cognitive, surveillance de la fonction cardiovasculaire.</p>	⚠	⚠

 Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Olanzapine <sup>B P</sup>	ZYPREXA VELOTAB®	oui	important	5 mg 10 mg 15 mg 20 mg	Cp. orodispersible	Laisser fondre dans la bouche ou dissoudre dans de l'eau. A administrer à heure fixe immédiatement après ouverture de la plaquette.	<p>Inapproprié selon la liste de Beers 2012 et Priscus. Effets anticholinergiques et léger effets extrapyramidaux, parkinsonisme, hypotonie, sédation, risque de chute, augmentation de la mortalité chez les patients déments. Alternative thérapeutique : neuroleptique atypique avec une balance bénéfice/risque favorable (ex : risperdone). Surveillance clinique des effets indésirables notamment anticholinergiques ou extrapyramidaux, antécédent de chute, surveillance des fonctions neurologique et cognitive, surveillance de la fonction cardiovasculaire.</p>	!/\	!/\

Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
<b>Benzamide</b>									
Tiapride	TIAPRIDAL®	oui	modéré / insuffisant	100 mg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. <i>A administrer avant le repas.</i>	Si impossibilité d'avaler, préférer la solution buvable.	/!\	/!\
Tiapride	TIAPRIDAL®	non	modéré / insuffisant	5 mg/goutte	Sol. buvable en gouttes (fl. 30 ml)	Utiliser le flacon compte- goutte pour prélever.	<i>Conservation : 1 mois après ouverture</i> Tenir compte de la teneur en potassium.	/!\	/!\
<b>Lithium</b>									
Lithium	THERALITHE®	non	important	250 mg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. A administrer au cours des repas.		/!\	
Lithium	TERALITHE®	non	important	400 mg	Cp. sécable à libération prolongée	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer, ni sucer. A administrer au cours du repas.		/!\	

Systeme nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
-----------------	--	-----------	-----	---------	-------------------	----------------------------	---------------------------------	----	----

### Autres antipsychotiques

<b>Risperidone</b>	RISPERDAL®	oui	important	1 mg 2 mg 4 mg	Cp. pelliculé sécable	A avaler avec de l'eau.		/!	/!
<b>Risperidone</b>	RISPERDAL®	oui	important	1 mg/ml	Sol. buvable (fl. 30, 60, 120 ml)	A avaler après dilution dans une boisson.		/!	/!
<b>Risperidone</b>	RISPERDAL® Constat LP	non	important	25 mg/2 ml 37,5 mg/2 ml 50 mg/2 ml	Susp. injectable à libération prolongée (poudre et solvant en seringue pré-remplie)	A administrer en IM profonde dans le muscle deltoïde ou fessier à l'aide de l'aiguille sécurisée appropriée.		/!	/!
<b>Risperidone</b>	RISPERDAL® Oro	oui	important	0,5 mg 1 mg 2 mg 3 mg 4 mg	Cp. orodispersible	Laisser fondre sur la langue ou avaler avec de l'eau.		/!	/!



■ Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
-------------------	--	-----------	-----	---------	-------------------	----------------------------	---------------------------------	----	----

Anxiolytiques

Dérivés de la benzodiazépine

Alprazolam <sup>BLP</sup>	XANAX®	oui	important	0,25 mg 0,5 mg 1 mg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. <i>Ecrasement possible des comprimés.</i>	Inapproprié selon la liste Priscus, et à une dose > à 2 mg/j selon la liste de Beers et de Laroche. Balance bénéfique/risque défavorable et efficacité discutable. Sensibilité aux effets indésirables accrue chez le sujet âgé. Risque de chute et de fracture, prolongement du temps de réaction, réaction psychiatrique, insuffisance cognitive, dépression. Alternatives thérapeutiques : benzodiazépine à demi-vie courte, ou intermédiaire, valériane, antidépresseurs sédatifs (miansérine, mirtazapine). Traitement non médicamenteux : traitement des troubles du sommeil. Surveillance des effets indésirables. Initier le traitement à la moitié de la dose usuelle et traiter sur la plus courte durée possible.	⚠	⚠
---------------------------	--------	-----	-----------	---------------------------	-------------	--	--	---	---

■ ■ Système nerveux

Spécialités de référence  
Dénomination commerciale

Générique

SMR

Dosages

Formes galéniques

Modalités d'administration

Sélection d'informations utiles

IR

IH

Oxazépam<sup>BLP</sup>

SERESTA®

non

important

10 mg  
50 mg

Comprimé  
Cp. sécable

A avaler avec de l'eau.  
*Ecrasement possible des comprimés.*

Inapproprié selon la liste de Beers, de Laroche, et Priscus à une dose > à 60 mg/j. Balance bénéfique/risque défavorable et efficacité discutable. Sensibilité aux effets indésirables accrue chez le sujet âgé. Risque de chute et de fracture, prolongement du temps de réaction, réaction psychiatrique, insuffisance cognitive, dépression. Alternatives thérapeutiques : benzodiazépine à demi-vie courte, ou intermédiaire, valériane, antidépresseurs sédatifs (miansérine, mirtazapine). Traitement non médicamenteux : traitement des troubles du sommeil. Surveillance des effets indésirables. Initier le traitement à la moitié de la dose usuelle et traiter sur la plus courte durée possible.

!/\


!/\

■ Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
-------------------	--	-----------	-----	---------	-------------------	----------------------------	---------------------------------	----	----

Hypnotiques et sédatifs

Médicaments liés aux benzodiazépines

Zolpidem <sup>BLP</sup>	STILNOX®	oui	important	10 mg	Cp. pelliculé sécable	A avaler avec de l'eau. A administrer immédiatement avant le coucher.	Inapproprié selon la liste de Beers 2012, de Laroche et Priscus à une dose > à 5 mg/j. Balance bénéfique/risque défavorable et efficacité discutable. Pas d'amélioration de l'efficacité et plus de risque d'effets indésirables lors de l'augmentation de la dose journalière au-delà de la demi-dose proposée chez l'adulte jeune. Risque de chute et de fracture, délai de réaction augmenté, réaction psychiatrique, insuffisance cognitive. Alternatives thérapeutiques : benzodiazépine ou apparentés à demi-vie courte ou intermédiaire, à la dose < ou égale à la moitié de la dose proposée chez l'adulte jeune, valériane, antidépresseurs sédatifs (miansérine, mirtazapine).	/!\	/!\
-------------------------	----------	-----	-----------	-------	-----------------------	--	--	-----	-----

 Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Zopiclone <sup>BLP</sup>	IMOVANE®	oui	important	3,75 mg 7,5 mg	Cp. pelliculé sécable	A avaler avec de l'eau. A administrer immédiatement avant le coucher.	<p>Inapproprié selon la liste de Beers 2012, de Laroche et Priscus à une dose &gt; à 3,75 mg/j. Balance bénéfique/risque défavorable et efficacité discutable. Pas d'amélioration de l'efficacité et plus de risque d'effets indésirables lors de l'augmentation de la dose journalière au-delà de la demi-dose proposée chez l'adulte jeune. Risque de chute et de fracture, délai de réaction augmenté, réaction psychiatrique, insuffisance cognitive.</p> <p>Alternatives thérapeutiques : benzodiazépine ou apparentés à demi-vie courte ou intermédiaire, à la dose &lt; ou égale à la moitié de la dose proposée chez l'adulte jeune, valériane, antidépresseurs sédatifs (miansérine, mirtazapine).</p> <p>Traitement non médicamenteux : traitement des troubles du sommeil. Surveillance des effets indésirables. Initier le traitement à la dose la plus faible (la moitié de la dose usuelle) et sur la plus courte durée possible.</p>	⚠	⚠

■ Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
-------------------	--	-----------	-----	---------	-------------------	----------------------------	---------------------------------	----	----

Psychoanaleptiques


Antidépresseurs

Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine

Paroxétine <sup>B</sup>	DEROXAT®	oui	important	20 mg	Cp. pelliculé sécable	<p>A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer au cours du repas. <i>Le comprimé peut être écrasé pour être administré par sonde naso-gastrique.</i></p>	<p>Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. <i>Si impossibilité d'avalier, il existe une solution buvable.</i> <b>Inapproprié selon la liste de Beers 2012. Peut exacerber ou causer un syndrome inapproprié d'hormone antidiurétique ou une hyponatrémie.</b> <b>Surveillance étroite de la natrémie à l'initiation du traitement ou en cas de changement de dose.</b></p>	!	!
-------------------------	----------	-----	-----------	-------	-----------------------	--	---	---	---


	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
<p><b>Paroxétine</b><sup>B</sup></p>	<p>DEROXAT®</p>	<p>non</p>	<p>important</p>	<p>20 mg/10 ml</p>	<p>Susp. buvable (fl.150 ml)</p>	<p>Agiter le flacon avant utilisation. A administrer au cours du repas. <i>En cas d'administration par sonde naso-gastrique, diluer dans de l'eau immédiatement avant administration.</i></p>	<p>Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. Conservation : 1 mois après ouverture. <b>Inapproprié selon la liste de Beers 2012. Peut exacerber ou causer un syndrome inapproprié d'hormone antidiurétique ou une hyponatrémie. Surveillance étroite de la natrémie à l'initiation du traitement ou en cas de changement de dose.</b></p>	<p>⚠</p>	<p>⚠</p>
<p><b>Citalopram</b><sup>B</sup></p>	<p>SEROPRAM®</p>	<p>oui</p>	<p>important</p>	<p>20 mg</p>	<p>Cp. pelliculé sécable</p>	<p>A avaler avec de l'eau.</p>	<p>Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. Si impossibilité d'avaler, il existe une solution buvable. <b>Inapproprié selon la liste de Beers 2012. Peut exacerber ou causer un syndrome inapproprié d'hormone antidiurétique ou une hyponatrémie. Surveillance étroite de la natrémie à l'initiation du traitement ou en cas de changement de dose.</b></p>	<p>⚠</p>	<p>⚠</p>

 Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
<b>Citalopram<sup>B</sup></b>	SEROPRAM®	non	important	40 mg/ml	Sol. buvable (fl. 12 ml)	Utiliser la seringue pour prélever. Dilution possible dans un peu d'eau.	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. Tenir compte de la teneur en éthanol. <i>Conservation : 16 semaines après ouverture.</i> <b>Inapproprié selon la liste de Beers 2012. Peut exacerber ou causer un syndrome inapproprié d'hormone antidiurétique ou une hyponatrémie.</b> <b>Surveillance étroite de la natrémie à l'initiation du traitement ou en cas de changement de dose.</b>	(!)	(!)
<b>Escitalopram<sup>B</sup></b>	SEROPLEX®	oui	important	5 mg 10 mg 15 mg 20 mg	Cp. pelliculé sécable (sauf le 5 mg)	A avaler avec un peu d'eau. Ne pas croquer. <i>Possibilité de broyer les comprimés. Diluer dans de l'eau et administrer immédiatement.</i>	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. <b>Inapproprié selon la liste de Beers 2012. Peut exacerber ou causer un syndrome inapproprié d'hormone antidiurétique ou une hyponatrémie.</b> <b>Surveillance étroite de la natrémie à l'initiation du traitement ou en cas de changement de dose.</b>	(!)	(!)

 Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Escitalopram <sup>B</sup>	SEROPLEX®	non	important	20 mg/ml	Sol. buvable (fl. 15 ml)	La solution buvable peut être mélangée à de l'eau.	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. Tenir compte de la teneur en éthanol. Conservation : 8 semaines après ouverture. <b>Inapproprié selon la liste de Beers 2012. Peut exacerber ou causer un syndrome inapproprié d'hormone antidiurétique ou une hyponatrémie.</b> <b>Surveillance étroite de la natrémie à l'initiation du traitement ou en cas de changement de dose.</b>	⚠	⚠
Sertraline <sup>B</sup>	ZOLOFT®	oui	important	25 mg 50 mg	Gélule	A administrer au cours du repas.	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. <b>Inapproprié selon la liste de Beers 2012. Peut exacerber ou causer un syndrome inapproprié d'hormone antidiurétique ou une hyponatrémie.</b> <b>Surveillance étroite de la natrémie à l'initiation du traitement ou en cas de changement de dose.</b>		⚠



■ Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Autres antidépresseurs									
Miansérine	Générique	oui	important	10 mg 30 mg 60 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. Ne pas croquer. <i>Ecrasement possible des comprimés.</i>			⚠
Venlafaxine <sup>B</sup>	EFFEXOR®	oui	important	37,5 mg 75 mg	Gélule à libération prolongée	A avaler avec de l'eau. Ne pas ouvrir, ni écraser, ni croquer ou dissoudre. <i>Ouverture possible de la gélule, ne pas écraser le contenu.</i>	Inapproprié selon la liste de Beers 2012. Peut exacerber ou causer un syndrome inapproprié d'hormone antidiurétique ou une hyponatrémie. Surveillance étroite de la natrémie à l'initiation du traitement ou en cas de changement de dose.	⚠	⚠
Venlafaxine <sup>B</sup>	Générique	oui	important	50 mg	Comprimé	A avaler avec de l'eau. A administrer au cours du repas. <i>Ecrasement possible du comprimé.</i>	Inapproprié selon la liste de Beers 2012. Peut exacerber ou causer un syndrome inapproprié d'hormone antidiurétique ou une hyponatrémie. Surveillance étroite de la natrémie à l'initiation du traitement ou en cas de changement de dose.	⚠	⚠

 Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Mirtazapine <sup>B</sup>	NORSET®	oui	important	15 mg	Comprimé	A avaler avec de l'eau. Ne pas mâcher. Administer à heure fixe. <i>Ecrasement possible du comprimé.</i>	Inapproprié selon la liste de Beers 2012. Peut exacerber ou causer un syndrome inapproprié d'hormone antidiurétique ou une hyponatrémie. Surveillance étroite de la natrémie à l'initiation du traitement ou en cas de changement de dose.	⚠	⚠
Mirtazapine <sup>B</sup>	NORSET®	non	important	15 mg/ml	Sol. buvable (fl. 66 ml)	Utiliser la pompe doseuse pour prélever. Diluer dans un petit peu d'eau avant administration. Administer à heure fixe.	Tenir compte de la teneur en éthanol. Conservation : 6 semaines après ouverture. Inapproprié selon la liste de Beers 2012. Peut exacerber ou causer un syndrome inapproprié d'hormone antidiurétique ou une hyponatrémie. Surveillance étroite de la natrémie à l'initiation du traitement ou en cas de changement de dose.	⚠	⚠

■ ■ Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
---------------------	--	-----------	-----	---------	-------------------	----------------------------	---------------------------------	----	----

## Médicaments contre la démence

### Anticholinestérasiques

<b>Donépezil</b>	ARICEPT®	oui	faible	5 mg 10 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. <i>Ecrasement possible des comprimés.</i>			<u>!</u>
<b>Donépezil</b>	ARICEPT®	oui	faible	5 mg 10 mg	Cp. orodispersible	A laisser fondre sur la langue ou avaler avec de l'eau.			<u>!</u>
<b>Rivastigmine</b>	EXELON®	non	faible	4,6 mg/24 h 9,5 mg/24 h	Dispositif transdermique	A appliquer sur une peau saine, propre et sèche, sans pilosité, sur le haut ou le bas du dos, le haut du bras ou la poitrine, à un endroit où il ne risque pas d'être décollé par des vêtements.			<u>!</u>
<b>Rivastigmine</b>	EXELON®	oui	faible	1,5 mg 3 mg 6 mg	Gélule	A avaler avec de l'eau. Ne pas ouvrir la gélule. Ne pas écraser. A administrer au cours du repas.	Si impossibilité d'avalier, il existe une solution buvable et un dispositif transdermique.	<u>!</u>	<u>!</u>
<b>Rivastigmine</b>	EXELON®	non	faible	2 mg/ml	Sol. buvable (fl. 50 ml)	Prélever à l'aide de la seringue doseuse. Utiliser pure ou diluer dans de l'eau. A administrer au cours du repas.	Conservation : 1 mois après ouverture.	<u>!</u>	<u>!</u>

Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Galantamine	REMINYL®	oui	faible	8 mg 16 mg 24 mg	Gélule à libération prolongée	A avaler avec de l'eau. Ne pas mâcher, ni écraser. A administrer au cours du repas.	Un apport liquidien adéquat est nécessaire pendant le traitement. Si impossibilité d'avaler, il existe une solution buvable.	⚠	⚠
Galantamine	REMINYL®	non	faible	4 mg 16 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. A administrer au cours du repas.	Un apport liquidien adéquat est nécessaire pendant le traitement. Si impossibilité d'avaler, il existe une solution buvable.	⚠	⚠
Galantamine	REMINYL®	non	faible	4 mg/ml	Sol. buvable (fl. 100 ml)	Utiliser la seringue présente dans la boîte pour prélever puis diluer dans un peu d'eau. A administrer au cours du repas.	Un apport liquidien adéquat est nécessaire pendant le traitement. Conservation : 3 mois après ouverture	⚠	⚠
<b>Autres médicaments contre la démence</b>									
Mémantine	EBIXA®	non	faible	10 mg 20 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. Administrer à heure fixe.	Si impossibilité d'avaler, il existe une solution buvable.	⚠	⚠
Mémantine	EBIXA®	non	faible	10 mg/ml (5 mg/pression)	Sol. buvable (fl. 50 ml)	Utiliser la pompe doseuse pour prélever. Dilution possible dans un peu d'eau. Administrer à heure fixe.	Conservation : 3 mois après ouverture.	⚠	⚠

■ Système respiratoire	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
------------------------	--	-----------	-----	---------	-------------------	----------------------------	---------------------------------	----	----

## Préparations nasales

### Décongestionnants et autres préparations à usage topique

#### Corticoïdes

<b>Tixocortol</b>	PIVALONE®	non	modéré	1%	Susp. nasale (fl. 10 ml)	A administrer en pulvérisation nasale.			
-------------------	-----------	-----	--------	----	-----------------------------	---	--	--	--

■ Système respiratoire	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
------------------------	--	-----------	-----	---------	-------------------	----------------------------	---------------------------------	----	----


## Médicaments pour les syndromes obstructifs des voies aériennes

### Adrénérgiques pour inhalation

#### Agonistes sélectifs β2-adrénérgiques

<b>Formotérol</b>	FORADIL®	non	important	12 µg	Poudre pour inhalation en gélule	A administrer en inhalation buccale en position assise ou debout. Ne pas avaler.			
<b>Salbutamol</b>	VENTOLINE® AIROMIR®	oui	important	100 µg/dose	Susp. pour inhalation (fl. pressurisé)	A administrer en inhalation buccale en position assise ou debout. Se rincer la bouche après inhalation.			
<b>Salbutamol</b>	VENTOLINE®	oui	important	2,5 mg/2,5 ml 5 mg/2,5 ml	Sol. pour inhalation par nébuliseur (unidose)	A administrer par voie inhalée exclusivement à l'aide d'un nébuliseur. Ne pas injecter, ne pas avaler. Dilution possible dans du sérum physiologique stérile.			
<b>Terbutaline</b>	BRICANYL Turbuhaler®	oui	important	500 µg/dose	Poudre pour inhalation	A administrer en inhalation buccale en position assise ou debout. Se rincer la bouche après inhalation.			

■ Système respiratoire	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
<b>Terbutaline</b>	BRICANYL®	oui	important	5 mg/2 ml	Sol. pour inhalation par nébuliseur (unidose)	A administrer par voie inhalée exclusivement à l'aide d'un nébuliseur. Ne pas injecter, ne pas avaler. A diluer dans du sérum physiologique stérile.			
<b>Adrénérgiques en association</b>									
<b>Fénotérol + ipratropium</b>	BRONCHODUAL®	non	important	50 µg + 20 µg	Sol. pour inhalation (fl. pressurisé)	A administrer en inhalation buccale en position assise ou debout. Se rincer la bouche après inhalation.			
<b>Salmétérol + fluticasone</b>	SERETIDE®	non	important	25 µg + 50 µg 25 µg + 125 µg 25 µg + 250 µg par dose	Susp. pour inhalation (fl. pressurisé)	A administrer en inhalation buccale en position assise ou debout. Tenir le flacon verticalement. Se rincer la bouche après inhalation.			
<b>Salmétérol + fluticasone</b>	SERETIDE Diskus®	non	important	50 µg + 100 µg 50 µg + 250 µg 50 µg + 500 µg par dose	Poudre pour inhalation (unidose)	A administrer en inhalation buccale en position assise ou debout. Tenir le flacon verticalement. Se rincer la bouche après inhalation.			
<b>Autres médicaments pour syndromes obstructifs des voies aeriennes, par inhalation</b>									
<b>Glucocorticoïdes</b>									
<b>Béclométasone</b>	BECOTIDE®	oui	important	250 µg/dose	Sol. pour inhalation (fl. pressurisé)	A administrer en inhalation buccale en position assise ou debout. Se rincer la bouche après inhalation.			

	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Béclométasone	QVARSPRAY® QVAR Autohaler®	non	important	100 µg/dose	Sol. pour inhalation (fl. pressurisé)	A administrer en inhalation buccale en position assise ou debout. Se rincer la bouche après inhalation.			
Béclométasone	MIFLASONE®	non	important	100 µg/dose 200 µg/dose 400 µg/dose	Poudre pour inhalation en gélule	A administrer en inhalation buccale en position assise ou debout. Se rincer la bouche après inhalation. Ne pas avaler.			
Budésonide	PULMICORT® Turbuhaler	non	important	100 µg/dose 200 µg/dose 400 µg/dose	Poudre pour inhalation (unidose)	A administrer en inhalation buccale en position assise ou debout. Se rincer la bouche après inhalation.			
Budésonide	PULMICORT®	oui	important	0,5 mg/2 ml 1 mg/2 ml	Susp. pour inhalation par nébuliseur (unidose)	A administrer en inhalation buccale en position assise ou debout. Dilution possible dans du sérum physiologique stérile. Se rincer la bouche après inhalation. Ne pas injecter, ne pas avaler.			



■ Système respiratoire	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
<b>Anticholinergiques</b>									
<b>Ipratropium bromure</b>	ATROVENT®	oui non	important	0,5 mg/ 2ml 0,5 mg/1ml	Sol. pour inhalation par nébuliseur (unidose)	A administrer par inhalation à l'aide d'un nébuliseur. Diluer dans du sérum physiologique pour obtenir 5 ml. Ne pas mettre en contact avec l'oeil. Ne pas avaler, ne pas injecter.			
<b>Tiotropium bromure</b>	SPIRIVA®	non	important	18 µg/dose	Poudre pour inhalation en gélule	A administrer en inhalation buccale en position assise ou debout. Administrer à heure fixe. Ne pas avaler.		/!\	
<b>Adrénérergiques pour usage systémique</b>									
<b>Agonistes sélectifs β2-adrénérergique à usage systémique</b>									
<b>Terbutaline</b>	BRICANYL®	non	important	5 mg	Cp. à libération prolongée	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. Administrer au cours d'un repas.			

■ Système respiratoire	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
------------------------	--	-----------	-----	---------	-------------------	----------------------------	---------------------------------	----	----

## Autres

### Antagonistes des récepteurs de leucotriène

<b>Montélukast</b>	SINGULAIR®	non	important	10 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. Ecrasement possible des comprimés à 5 mg (dosage enfant) Administer au cours ou en dehors d'un repas.			<u>!</u>
--------------------	------------	-----	-----------	-------	---------------	---	--	--	----------

## Médicaments de la toux et du rhume

### Mucolytiques

<b>Acétylcystéine</b>	MUCOMYST®	oui	insuffisant	200 mg	Sol. buvable (poudre en sachet)	A diluer dans de l'eau.	Tenir compte de la présence de sodium.		
<b>Acétylcystéine</b>	MUCOMYST®	oui	insuffisant	200 mg/5 ml	Susp. buvable (poudre)	A dissoudre dans de l'eau.	Tenir compte de la présence de sodium. Conservation : 12 jours après reconstitution.		
<b>Acétylcystéine</b>	FLUIMUCIL®	oui	insuffisant	200 mg	Sol. buvable (granulés en sachet)	A dissoudre dans de l'eau.			

■ Système respiratoire		Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
	<b>Acétylcystéine</b>	FLUIMUCIL® (sans sucre)	oui	insuffisant	2% (2g/100ml)	Sol. buvable (fl. 200 ml)	Utiliser le gobelet doseur.	Tenir compte de la présence de sodium. Conservation : 12 jours après reconstitution.		
	<b>Carbocistéine</b>	BRONCHOKOD® (sans sucre)	oui	insuffisant	5% (5g/100ml)	Sol. buvable (fl. 250 ml)	A avaler à l'aide de la cuillère mesure.	Tenir compte de la présence de sodium. <i>Conservation : ne pas conserver au-delà de la durée du traitement.</i>		
<b>Antitussifs</b>										
	<b>Hélicidine</b>	HELICIDINE®	non	faible	0,5 ml/5 ml	Sirop (fl. 125, 250 ml)	A avaler à l'aide de la cuillère mesure.	Tenir compte de la teneur en sucre. <i>Conservation : 6 mois après ouverture.</i>		
<b>Antihistaminiques à usage systémique</b>										
<b>Dérivé de la pipérazine</b>										
	<b>Lévocétirizine</b>	XYZALL®	oui	modéré	5 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau . Ne pas écraser, ne pas croquer. Ecrasement possible des comprimés. Administrer immédiatement après broyage.		/!\	

■ Système respiratoire	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
------------------------	--	-----------	-----	---------	-------------------	----------------------------	---------------------------------	----	----

### Autres antihistaminiques à usage systématique

<b>Desloratadine</b>	AERIUS®	oui	modéré	5 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. Ecrasement possible des comprimés. Administration possible de la poudre dans la sonde entérale.	Si impossibilité d'avalier préférer la solution buvable 0,5 mg/ml.	/!\	
<b>Desloratadine</b>	AERIUS®	oui	modéré	0,5 mg/ml	Sol. buvable (fl. 125 ml)	Avaler la dose de solution buvable prélevée à l'aide de la seringue graduée. Prendre un verre d'eau après la prise.	Conservation : 3 mois après ouverture.	/!\	
<b>Loratadine</b>	CLARITYNE®	oui	modéré	10 mg	Comprimé	A avaler avec de l'eau.			/!\
<b>Loratadine</b>	CLARITYNE®	oui	modéré	1mg/ml	Sirop (fl. 60, 120 ml)	A avaler à l'aide de la cuillère mesure.	Conservation : 1 mois après ouverture.		/!\

■ Organes sensoriels	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
----------------------	--	-----------	-----	---------	-------------------	----------------------------	---------------------------------	----	----

Médicaments ophtalmologiques

Anti-inflammatoires

Anti-inflammatoires non stéroïdiens

Indométacine <sup>BLP</sup>	INDOCOLLYRE®	non	important	0.10%	Collyre (fl. 5 ml ou unidose)	En instillation oculaire. A administrer à distance d'autres médicaments par voie oculaire (minimum 15 minutes).	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. Conservation : 15 jours après ouverture. <b>Inapproprié selon la liste de Beers, de Laroche et Priscus. Risque d'hémorragies gastro- intestinales, d'ulcération, de perforation, de troubles du système nerveux central en cas de passage systémique. Surveillance des manifestations gastro- intestinales, de la fonction rénale, cardiovasculaire.</b>	/!	/!
-----------------------------	--------------	-----	-----------	-------	----------------------------------	---	--	----	----

■ Organes sensoriels	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Anti-inflammatoires et anti-infectieux en association									
Corticoïdes et anti-infectieux en association									
Dexaméthasone + oxytétracycline	STERDEX®	non	modéré	0,267 mg + 1,335 mg	Pommade ophtalmique (unidose)	Appliquer la pommade dans le cul de sac conjonctival inférieur de l'oeil et éventuellement sur le bord de la paupière. A administrer à distance d'autres médicaments par voie oculaire (minimum 15 minutes).	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK.		
Antiglaucomeux et myotiques									
Parasympathomimétiques									
Pilocarpine	PILO®	non	important	2%	Collyre (fl. 10 ml)	En instillation oculaire. A administrer à distance d'autres médicaments par voie oculaire (minimum 15 minutes).	Conservation : 4 semaines après ouverture.		
Pilocarpine	ISOPTO- PILOCARPINE®	non	important	0,50% 1% 2%	Collyre (fl. 10 ml)	En instillation oculaire. A administrer à distance d'autres médicaments par voie oculaire (minimum 15 minutes).	Conservation : 15 jours après ouverture.		

■ Organes sensoriels	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
----------------------	--	-----------	-----	---------	-------------------	----------------------------	---------------------------------	----	----

### Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique

<b>Acétazolamide</b>	DIAMOX®	non	important	250 mg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. A administrer au cours d'un repas. <i>Ecrasement possible des comprimés. A administrer avec un aliment pour masquer l'amertume.</i>		⚠	⚠
----------------------	---------	-----	-----------	--------	-------------	---	--	---	---

### Bétabloquants

<b>Timolol</b>	TIMABAK®	oui	important	0,25% 0,50%	Collyre (fl. 5 ml)	En instillation oculaire. A administrer à distance d'autres médicaments par voie oculaire (minimum 15 minutes).	Conservation : 8 semaines après ouverture.	⚠	⚠
<b>Timolol</b>	TIMOPTOL®	oui	important	0,25% 0,5%	Collyre (fl. 3 ml) Collyre à libération prolongée (fl. 2,5 ml)	En instillation oculaire. A administrer à distance d'autres médicaments par voie oculaire (minimum 15 minutes).	Conservation : 4 semaines après ouverture.	⚠	⚠

### Analogues de prostaglandine

<b>Latanoprost</b>	XALATAN®	non	important	0.005%	Collyre (fl. 2,5 ml)	En instillation oculaire. A administrer à distance d'autres médicaments par voie oculaire (minimum 15 minutes).	Conservation : 4 semaines après ouverture.		
--------------------	----------	-----	-----------	--------	-------------------------	--	--	--	--

### Autres médicaments ophtalmologiques

<b>Carbomère</b>	LACRIGEL®	non	important	0.20%	Gel ophtalmique (tb. 5, 10 g)	En instillation oculaire. A administrer à distance d'autres médicaments par voie oculaire (minimum 15 minutes).	Conservation : 4 semaines après ouverture.		
------------------	-----------	-----	-----------	-------	----------------------------------	--	--	--	--

■ Organes sensoriels	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
<b>Carbomère</b>	GEL LARMES®	non	important	0.30%	Gel ophtalmique (tb. 10 g, unidose)	Instiller dans le cul-de-sac conjonctival inférieur. A administrer à distance d'autres médicaments par voie oculaire (minimum 15 minutes).	Conservation : 4 semaines après ouverture.		
<b>Larmes artificielles</b>	LARMABAK®	non	important	0.90%	Collyre (fl. 10 ml)	En instillation oculaire. A administrer à distance d'autres médicaments par voie oculaire (minimum 15 minutes).	Conservation : 8 semaines après ouverture.		
<b>Rétinol</b>	VITAMINE A DULCIS®	non	modéré	25 000 UI/100 g	Pommade ophtalmique (tb. 10 g)	Appliquer l'équivalent d'un grain de riz dans le cul de sac conjonctival. A administrer à distance d'autres médicaments par voie oculaire (minimum 15 minutes).	Conservation : 4 semaines après ouverture.		

## Médicaments otologiques

### Anti-infectieux

<b>Ofloxacin</b>	OFLOCET®	oui	important	1,5 mg/0,5 ml	Sol. auriculaire (unidose)	Instillation auriculaire. Maintenir la tête penchée sur le côté pendant environ 5 minutes, afin de faciliter la pénétration des gouttes dans le conduit auditif externe.			
<b>Rifamycine</b>	OTOFA®	non	important	3%	Sol. auriculaire (fl. 10 ml)	En instillation dans le conduit auditif ou sous forme de bains d'oreille de quelques minutes avec la solution tiédie pure.	Conservation : ne pas conserver au-delà de la durée du traitement.		



■ Organes sensoriels	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Autres médicaments otologiques									
Xylène	CERULYSE®	non	non remboursé	5%	Sol. auriculaire (fl. 10 ml)	Instiller quelques gouttes ou procéder à un bain d'oreille. Réchauffer le flacon entre les mains avant l'emploi.	Conservation : 4 semaines après ouverture.		