

Classification NYHA -- Retentissement fonctionnel

Classe	Description	IDE : adapter
I	Asymptomatique a l'effort habituel	Encourager activite adaptee
II	Symptomes pour efforts importants	Surveiller tolerance effort
III	Symptomes pour efforts minimales	Adapter soins, prevention epuisement
IV	Symptomes au repos www.soignantenehpad.fr	Surveillance rapprochee, ETP

Surveillance IDE -- Patient cardiaque

Parametre	Valeur alerte	Action
Poids quotidien	+2 kg / 2 jours	Alerte medecin : retention hydrique
PA systolique	< 90 mmHg ou chute > 30	Alerte immediate
FC	> 120 ou < 50 /min	Alerte + ECG
SpO2	< 92 %	O2 + alerte
Diurese	< 0,5 mL/kg/h sur 2h	Alerte renale
Oedemes	Augmentation	Coter, tracer, signaler

OAP (urgence) : Position demi-assise, O2, alerte immediate, VVP. Signes : dyspnee intense, crepitants diffus, expectoration moussue rose, SpO2 basse.

Pharmacologie cardiovasculaire -- Surveillance IDE

Classe	Exemples	Surveillance cle
Diuretiques	Furosemide	K+ (hypokaliemie), poids, diurese
IEC / ARAII	Ramipril	PA, creatinine, K+ (hyperkaliemie)
Beta-bloquants	Bisoprolol	FC (ne pas donner si FC < 50)
Anticoagulants	HBPM, AVK, AOD	Signes hemorragiques, INR si AVK
Antiagregeants	Aspirine, clopidogrel	Saignements digestifs