

Cibles SpO2 selon le contexte -- REGLE CRITIQUE

Population	Cible SpO2	Risque si depasse
Patient standard	94 - 98 %	Risque faible
BPCO severe hypercapnique	88 - 92 %	Narcose hypercapnique si O2 excessif
Grossesse / cardiopathie	> 95 %	Hypoxie foetale si dessous

Evaluation de la severite d'une crise d'asthme

Signe	Legere	Moderee	Aigu grave
Parole	Phrases completes	Phrases courtes	Mots isoles
SpO2	> 95 %	91 - 94 %	< 90 %
FR	< 20 /min	20 - 25	> 25 /min
Tirage	Absent	Modere	Important
Action	Bronchodil.	Bronchodil + O2	URGENCE VITALE

Signes de gravite respiratoire -- Alerter sans delai

Signe	Seuil d'alerte
FR	> 25 /min ou < 8 /min
SpO2	< 92 % (< 88 % si BPCO)
Parole	Mots isoles ou mutisme
Tirage	Intercostal, sus-claviculaire, sus-sternal
Conscience	Agitation ou somnolence

Narcose hypercapnique (BPCO) : Somnolence + FR basse + SpO2 stable = urgence. Baisser O2, alerter medecin, GDS urgent.