

Conduite à tenir hypoglycémie

Situation	Action
Glycémie < 0,70 g/L + conscient	15 g glucides rapides (3 sucres ou 150 mL jus). Recontrôler à 15 min.
Glycémie < 0,50 g/L + inconscient	Glucagon SC/IM OU G30 % IV selon prescription. Jamais forcer l'alimentation.
Acidocétose (DT1)	Insuline IV + rehydratation + ionogramme (K+). Scope. Urgence.

Regles insuline : Glycémie avant injection. Rotation des sites SC obligatoire. Ne jamais injecter dans une lipodystrophie. Rapide = avant repas. Lente = heure fixe.

Thyroïde

Pathologie	Signes	Traitement / Surveillance
Hyperthyroïdie	Tachycardie, amaigrissement, tremblements, thermophobie, goitre, exophtalmie (Basedow)	ATS (carbimazole) : NFS hebdo, angine febrile = stop + urgence
Hypothyroïdie	Bradycardie, prise poids, frilosité, fatigue, peau sèche, myxoedème	Levothyrox : à jeun 30 min avant repas. Espacer calcium/fer de 2h. TSH à 6-8 sem.

UE B.1 Sciences biomédicales - Thème 8 : Système endocrinien - Programme 2 - Arrêté du 20 février 2026