

Classification des locaux selon le risque infectieux

Un établissement de santé présente une grande diversité de locaux où les exigences de propreté pour les surfaces et les équipements dépendent des critères suivants : activités pratiquées, type de patients, acte médical effectué.

Le guide du bionettoyage classe les locaux en 4 zones selon le risque infectieux encouru par le patient. Il s'agit d'une proposition de classification qui peut être révisée par chaque CLIN, conseillers techniques, en collaboration avec les responsables de l'entretien.■

Tableau 1 : Classification des locaux

1	2	3	4
Risques minimales	Risques moyens	Risques sévères	Très hauts risques
Halls Bureaux Services administratifs Services techniques Maison de retraite Résidence pour personnes âgées	Circulations Ascenseurs Escaliers Salles d'attente Consultation externe Salles de Rééducation Fonctionnelle Maternité Unité d'hébergement pour personnes âgées Service long et moyen séjour Psychiatrie Stérilisation centrale (zone de lavage) Pharmacie Blanchisserie Locaux d'entreposage intermédiaire des déchets ou du linge sale Sanitaires	Soins intensifs, réanimation Urgences Salle de "petite chirurgie" Salle de soins post-interventionnelle (salle de réveil) Salle d'accouchement Nurserie Biberonnerie Pédiatrie Chirurgie Médecine Hémodialyse Radiologie Laboratoires Exploration Fonctionnelle Stérilisation centrale (zone de conditionnement) Salle d'autopsie	Néonatalogie Bloc opératoire Service de greffe Service de brûlés
		Oncologie, Oncohématologie Hématologie Endoscopie Hémodynamique Imagerie médicale interventionnelle	

Rédaction : A REGARD, Lyon

► Pour en savoir plus

Guides et recommandations officiels

. CCLIN Sud-Ouest. Entretien des locaux des établissements de soins. 2005, 49 pages. (NosoBase n°15567)

. Commission Central des marchés. Guide du bionettoyage. Recommandation n°E-1-90, GPEM\SL N° 5670. 1990, 81 pages.